


PHUDSKIN

Viên nén nhỏ, Mùi dâu

Domperidon 10mg



**ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ
CÁC TRIỆU CHỨNG:**

- Nôn, buồn nôn
- Khó tiêu sau bữa ăn



SĐK : VD - 14371 - 11

*Nguyen...
12/9/11*

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quản cáo thuốc
của Cục Quản Lý Dược: XXXX/XX/QLĐ-TT, ngày tháng ... năm..
Ngày...tháng...năm in tài liệu.
Phản thông tin chi tiết sản phẩm xem trang 2

Viên Nén
10mg

PHUDSKIN

Domperidon 10mg

Viên Nén
10mg

★ **CÔNG THỨC :** Mỗi viên chứa :

Domperidon maleat

tương đương Domperidon ... 10 mg

Tá dược : Ludipress, Avicel, Natri lauryl sulfat, DST, Magnesi stearat, Bột hương dâu, Acesulfam potassium

★ **TRÌNH BÀY :**

Vĩ 10 viên, hộp 3 vĩ, hộp 6 vĩ, hộp 10 vĩ, hộp 25 vĩ và hộp 50 vĩ.

Chai 60 viên, Chai 100 viên, Chai 250 viên và Chai 500 viên.

★ **CHỈ ĐỊNH :**

Điều trị triệu chứng buồn nôn và nôn nặng, đặc biệt ở người bệnh đang điều trị bằng thuốc độc tế bào.

Điều trị triệu chứng buồn nôn, nôn, cảm giác chướng và nặng vùng thượng vị, khó tiêu sau bữa ăn do thức ăn chậm xuống ruột.

★ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH :**

Nôn sau khi mổ.

Chảy máu đường tiêu hoá.

Tắc ruột cơ học.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.

Dùng Domperidon thường xuyên hoặc dài ngày.

★ **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG :**

Phải uống thuốc 15 – 30 phút trước bữa ăn.

Người lớn : Cứ 4 đến 8 giờ, uống một liều 10 – 20 mg (tối đa 1 mg/kg).

Trẻ em : Cứ 4 đến 8 giờ, uống 1 liều 200 – 400 microgam/kg

★ **THẬN TRỌNG KHI DÙNG :**

Chỉ được dùng Domperidon không quá 12 tuần cho bệnh nhân Parkinson. Có thể xuất hiện các tác dụng có hại ở thần kinh trung ương. Chỉ dùng Domperidon cho người bệnh Parkinson khi các biện pháp chống nôn khác, an toàn hơn không có tác dụng.

Phải giảm 30 – 50% liều cho người suy bệnh suy thận và cho uống thuốc làm nhiều lần trong ngày.

Cần thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

★ **TÁC DỤNG PHỤ :**

Hiếm gặp, ADR < 1/1000.

Domperidon khó qua được hàng rào máu – não và ít có khả năng hơn metoclopramid gây ra các tác dụng ở thần kinh trung ương như phản ứng ngoại tháp hoặc buồn ngủ. Rối loạn ngoại tháp và buồn ngủ xảy ra với tỷ lệ rất thấp và thường do rối loạn tính thấm của hàng rào máu – não (trẻ đẻ non, tổn thương màng não) hoặc do quá liều.

Chảy sữa, rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, vú to hoặc đau tức vú do tăng prolactin huyết thanh có thể gặp ở người bệnh dùng thuốc liều cao dài ngày.

★ **TƯƠNG TÁC THUỐC :**

Có thể dùng Domperidon cùng với các thuốc giải lo.

Các thuốc kháng cholinergic có thể ức chế tác dụng của Domperidon. Nếu buộc phải dùng kết hợp với các thuốc này thì có thể dùng atropin sau khi đã uống Domperidon.

Nếu dùng Domperidon cùng với các thuốc kháng acid hoặc thuốc ức chế tiết acid thì phải uống Domperidon trước bữa ăn và phải uống các thuốc kháng acid hoặc thuốc ức chế tiết acid sau bữa ăn.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú :

PHỤ NỮ MANG THAI : Domperidon không gây quái thai. Tuy nhiên, để an toàn, tránh dùng thuốc cho người mang thai.

PHỤ NỮ CHO CON BÚ : Domperidon bài tiết vào sữa mẹ với nồng độ thấp; không dùng thuốc cho người cho con bú.

★ **QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ :**

Xử trí ngộ độc cấp và quá liều : gây lợi niệu thẩm thấu, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng.

★ **BẢO QUẢN :** Nơi khô mát (dưới 25°C), tránh ánh sáng

★ **THUỐC SẢN XUẤT THEO:** TCCS

★ **HẠN DÙNG :** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

*Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng
Để Xa Tầm Tay Trẻ Em*

Sản xuất tại :

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

Lô 7, đường 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM.

ĐT : (08) 37540724 - 3754725, FAX : (08) 37505807

Website: orientpharma.vn, Email: phuongdongpharma@vnn.vn

