

## TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC PHUGIA

### • Công thức cho 1 viên:

| <i>Hoạt chất :</i> | <i>Tên khoa học</i>                | <i>Hàm lượng</i> |                                       |
|--------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Cam thảo           | Radix Glycyrrhizae                 | 0,1 g            |                                       |
| Bạch truật         | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | 0,1 g            |                                       |
| Gừng khô           | Rhizoma Zingiberis                 | 0,05 g           |                                       |
| Mạch nha           | Fructus Hordei germinatus          | 0,1 g            |                                       |
| Phục linh          | Poria                              | 0,1 g            |                                       |
| Bán hạ chế         | Rhizoma Pinelliae                  | 0,15 g           | Tương đương 220 mg<br>cao khô hỗn hợp |
| Đẳng sâm           | Radix Codonopsis                   | 0,15 g           |                                       |
| Hậu phác           | Cortex Magnoliae officinalis       | 0,2 g            |                                       |
| Chi thực           | Fructus Auratii immaturus          | 0,3 g            |                                       |
| Ngô thù du         | Fructus Euodiae                    | 0,25 g           |                                       |
| <i>Tá dược:</i>    |                                    | <i>Hàm lượng</i> |                                       |
| Bột talc           | Talcum                             | 4 mg             |                                       |
| Magnesi Stearat    | Magnessii stearas                  | 6 mg             |                                       |

- **Dạng bào chế:** Viên nang cứng.
- **Quy cách đóng gói:** 10 viên/vi, 10 vi + 1 tờ HDSD/ hộp.
- **Chỉ định:** Chữa viêm loét dạ dày hành tá tràng, đau vùng thượng vị, đầy bụng,ợ hơi, ợ chua, ăn uống không tiêu.
- **Liều dùng – Cách dùng:**
  - Liều dùng: Ngày uống 2-3 lần;
  - + Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần 3 viên.
  - + Trẻ em từ 2-7 tuổi: Mỗi lần 1 viên.
  - + Trẻ em từ 8-12 tuổi: Mỗi lần 2 viên.
- **Cách dùng:** Uống với nước đun sôi để nguội
- **Chống chỉ định:** Không dùng cho phụ nữ có thai và người đang cho con bú.
- **Tác dụng không mong muốn:** Chưa có tài liệu nào nói về tác dụng không mong muốn của thuốc.
- **Kiểm kỵ, tương tác:** Không.
- **Bảo quản:** Nơi khô mát, tránh nóng ẩm.
- **Tiêu chuẩn:** TCCS
- **Hạn dùng:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ. Thông báo bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc**

**ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM**

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

Mọi chi tiết xin liên hệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Số 725 - Đường Yên Ninh – TP. Yên Bái – Tỉnh Yên Bái

ĐT: 0293 852 523

Fax: 0293 850 364