

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

medana

Pirolam

**Hỗn dịch dùng ngoài ciclopirox olamin
10 mg/g**

Mô tả
Hỗn dịch trắng, đặc.

Thành phần
Hoạt chất: Ciclopirox olamin 10 mg/g
Tá dược: Cồn propylen 50 mg, cón benzyl 9 mg, paraffin lỏng 15 mg, cón cetostearyl 27 mg, acid lactic 4 mg, macrogol cetostearyl ether 15 mg, nước tinh khiết vừa đủ 1 g.

Thuốc dùng cho bệnh gì?
Hoạt chất của Pirolam là ciclopirox olamin. Pirolam là thuốc chống nấm dùng tại chỗ.
Ciclopirox tác dụng trên tất cả các nấm da, nấm men, nấm mốc và nấm hỗn hợp, nấm *Aspergillus fumigatus* và một số vi khuẩn Gram dương và Gram âm. Thuốc cũng có tác dụng kháng viêm do vậy dùng tốt trong viêm da nấm.
Ciclopirox thâm nhập vào tóc, các nang tóc, thông qua lớp biểu bì và tuyến bã nhờn.

Chỉ định
Điều trị các bệnh nấm da, nấm da đầu, nấm da chân, nấm móng và nấm da đầu gây ra bởi:
- *Trichophyton rubrum*
- *Trichophyton mentagrophytes*
- *Epidermophyton floccosum*
- *Microsporum canis*
- *Microsporum gypseum*
- *Candida albicans*
- *Candida tropicalis*
- *Candida krusei*
- *Candida parapsilosis*
- *Cryptococcus neoformans*
- *Aspergillus fumigatus*.
Các nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram dương và Gram âm, cũng như mycoplasma.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?
Nên dùng Pirolam theo hướng dẫn của bác sỹ. Nếu bạn không hiểu điều gì, hãy hỏi bác sỹ hoặc dược sỹ.
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi Bôi thuốc tại chỗ lên da.
Nếu bác sỹ không yêu cầu dùng khác, bôi Pirolam 2 lần 1 ngày lên vùng da nhiễm bệnh, xoa nhẹ thuốc lên da, để hỗn dịch khô tự nhiên. Nên tiếp tục dùng thuốc cho đến khi các triệu chứng đã hết. Thời gian điều trị tối ưu của ciclopirox olamin lên tới 3 tuần. Nhằm ngăn ngừa tái phát, nên tiếp tục điều trị 10 ngày sau khi các tổn thương đã hồi phục. Thông báo bác sỹ nếu bệnh không cải thiện sau 4 tuần.

Không sử dụng vải hay miếng dán, ngoại trừ trị nấm móng có thể dùng băng kín dần lên vùng bị nhiễm.

Khi nào không nên dùng thuốc này?
- Khi bị mẫn cảm với ciclopirox hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Pirolam không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Không dùng thuốc này cho nấm ở mắt hoặc các mô xung quanh mắt hoặc âm đạo.

Tác dụng không mong muốn
Như bất kỳ loại thuốc nào, Pirolam có thể gây tác dụng không mong muốn. Các tác dụng không mong muốn gồm ngứa, kích ứng da, ban đỏ, ngứa, và phù nề quanh sát thấy ở một số bệnh nhân (1-4%).
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
Hãy cho bác sỹ hoặc dược sỹ biết bạn đang dùng hoặc gần đây đã dùng bất kỳ loại thuốc nào, gồm các thuốc dùng tự ý không theo đơn.
Không có tương tác khi bôi thuốc đồng thời với kem hydrocortison 1%.
Ciclopirox tác dụng hiệp đồng với itraconazol hoặc terbinafin, do đó cần giảm liều các thuốc dùng đồng thời.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?
Nếu bạn quên một liều Pirolam, hãy dùng ngay khi có thể. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều bị quên.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
Pirolam dùng tại chỗ không gây độc. Đôi khi có thể bị kích ứng da do thuốc.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo
Dù liệu về quá liều thuốc dùng tại chỗ chứa ciclopirox olamin chưa có sẵn.

Thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu
Nhà sản xuất:
Medana Pharma SA
Wl. Lokietka 10
98-200 Sieradz
Ba Lan

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này

Trước khi dùng Pirolam nên hỏi bác sỹ.

- Không được gãi ngứa và làm trầy xước các tổn thương do nấm.
- Tránh để thuốc tiếp xúc với mắt.
- Tránh mặc quần áo và giày không thấm thấm ẩm và hơi nóng
- Sau khi rửa hoặc tắm, lau khô kỹ càng các vùng bị nhiễm bệnh.
- Hàng ngày thay quần áo, khăn tắm, băng gạc (nấm móng) nếu tiếp xúc trực tiếp với vùng nhiễm bệnh. Giặt ở nhiệt độ 90°C (nên sử dụng khăn tắm dùng 1 lần).
- Thuốc chứa cồn propylen có thể gây kích ứng da.
Thuốc chứa cồn cetostearyl có thể gây dị ứng da và đôi khi có thể gây co thắt phế quản.

Có nên dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú?

Phụ nữ có thai

Nếu có thai hoặc có ý định mang thai, hãy xin ý kiến bác sỹ. Bác sỹ sẽ quyết định có nên dùng thuốc trong thai kỳ hay không.

Chỉ nên dùng thuốc ciclopirox trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích cho mẹ vượt quá nguy cơ đối với bào thai.

Phụ nữ cho con bú

Chỉ dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú khi thật cần thiết.

Có nên dùng thuốc khi lái xe hay vận hành máy móc?

Pirolam không ảnh hưởng lên khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ

Hãy liên hệ với bác sỹ nếu bệnh không cải thiện sau 4 tuần, hoặc nếu bạn trải qua các tác dụng không mong muốn, đặc biệt các tác dụng không được mô tả ở đây, hoặc các phản ứng dị ứng. Nếu bạn khoản điều gì, hãy hỏi bác sỹ hoặc dược sỹ.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Bảo quản nơi khô mát dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Đề xa tầm tay trẻ em.

Quy cách đóng gói

Hộp 1 tuýp 20 g hỗn dịch dùng ngoài.

Hạn sử dụng của thuốc

2 năm từ ngày sản xuất.

Ngày sửa đổi/cập nhật thông tin

29.10.2018