

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

QUY TỶ AN THẦN HOÀN P/H

Thành phần: (cho 1 hoàn mấm)

Bột Táo nhân (<i>Pulveres semensis ziziphi mauritianae</i>)	: 0,72g
Bột Bạch linh (<i>Pulveres poriae</i>)	: 0,65g
Bột Bạch truật (<i>Pulveres rhizomae atractylodis macrocephalae</i>)	: 0,65g
Bột Hoàng kỳ (<i>Pulveres radices astragali membranacei</i>)	: 0,6g
Bột Đương quy (<i>Pulveres radices angelicae sinensis</i>)	: 0,35g
Bột Đẳng sâm (<i>Pulveres radices codonopsis pilosulae</i>)	: 0,32g
Bột Viễn chí (<i>Pulveres radices polygalae</i>)	: 0,32g
Bột Cam thảo (<i>Pulveres radices glycyrrhizae</i>)	: 0,26g
Bột Đại táo (<i>Pulveres fructi ziziphi jujubae</i>)	: 0,25g
Bột Mộc hương (<i>Pulveres radices saussureae lappae</i>)	: 0,16g
Long nhãn (<i>Arillus Longan</i>)	: 0,6g
Tá dược (mật ong, nước tinh khiết)	: vừa đủ 9g



Dạng bào chế: Hoàn mấm.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 hoàn mấm x 9g.

Chỉ định:

Kiên tỳ - An thần - Ich khí - Bổ huyết.

Dùng trong trường hợp tâm tỳ đều hư, chán ăn, ngủ kém, nhanh quên, đầu nhỏ, thiếu máu, hay chóng mặt, xây xẩm, người mệt mỏi, thần kinh suy nhược.

Cách dùng & liều dùng:

- Ngày uống 2 - 3 lần, mỗi lần 1 - 2 viên, uống trước bữa ăn.
- Đợt điều trị 10 - 12 tuần, có thể dùng thường xuyên.

Tác dụng phụ:

Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng không mong muốn này.

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc trong trường hợp lái xe, vận hành máy móc.

Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Do thuốc có tác dụng an thần nên cần thận trọng khi dùng thuốc trong trường hợp lái xe, vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Trong thời gian dùng thuốc, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, chè, cà phê....

Quá liều và cách xử trí: Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều. Khi dùng thuốc quá liều, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

Tiêu chuẩn: TCCS.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Website: www.dongduocphuchung.com.vn

Điện thoại: 04. 33824177 - 33826222

Fax: 04. 33978024

