

# Dung dịch nhỏ mắt **Samil-Vidone**

## Povidon 20mg/ ml



SDK: VN – 17583 - 13

**THÀNH PHẦN:** Mỗi chai 10ml chứa:

- **Hoạt chất:** Povidon 200mg
- **Tá dược:** Dung dịch đậm đặc benzalkonium chlorid 10%, acid boric, natri clorid, natri hydroxid, nước pha tiêm.

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 lọ 10ml

**DẠNG BÀO CHẾ:** Dung dịch nhỏ mắt dạng nước, trong suốt, không màu.


**Chất bảo quản BAK 10%:** 0,05mg/ml

Samilvidone (Povidon) tác dụng theo cơ chế cơ học. Sau khi nhỏ Povidon vào mắt, Povidon sẽ tạo thành một màng mỏng bao phủ bề mặt nhãn cầu, giúp:

- Ngăn chặn không cho nước mắt bốc hơi, giữ ẩm và bôi trơn bề mặt nhãn cầu.
- Là một màng đệm ngăn cách giữa lớp nước mắt và kính tiếp xúc cứng.
- Ngăn chặn dị ứng nguyên tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhãn cầu.

→ **Hữu dụng trong:**

- Làm giảm các triệu chứng của khô mắt.
- Mang kính tiếp xúc cứng.
- Kết hợp điều trị khô mắt trong Viêm kết - giác mạc dị ứng.



### DƯỢC LỰC HỌC:

- Dung dịch nhỏ mắt Samilvidone không chứa bất kỳ hợp chất nào có hoạt tính dược lý.
- Do tính chất vật lý, các polymer tan trong nước không gây kích ứng có thể được dùng để làm ẩm và làm trơn bề mặt của mắt.

### DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Sau khi dùng đường uống, povidon có trọng lượng phân tử 12.600 được thải trừ nhanh trong nước tiểu, phần lớn được đào thải trong vòng 11 giờ.
- Sau khi dùng đường tĩnh mạch, có thể tránh được sự tích lũy povidon dài hạn bằng cách giảm tỉ lệ povidon trọng lượng phân tử cao hơn 25.000.
- Do kích thước tương đối lớn của phân tử povidon, không chắc có sự thâm nhập qua giác mạc.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Dị ứng povidon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

### CHỈ ĐỊNH:

Dung dịch nhỏ mắt Samilvidone được chỉ định để làm giảm triệu chứng kích thích do khô mắt và các triệu chứng của khô mắt. Thuốc còn có thể dùng như một dung dịch nhỏ mắt làm dễ chịu trong khi mang kính sát trùng cứng.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Nhỏ 1 giọt hoặc 2 giọt vào mắt bệnh, 4-5 lần/ngày. Liều dùng có thể thay đổi tùy theo triệu chứng của bệnh nhân.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Các tác dụng không mong muốn đã được báo cáo bao gồm:

#### Rối loạn hệ thống miễn dịch:

- *Rất hiếm (<1/10000):* gây kích ứng hoặc phản ứng quá mẫn.

#### Rối loạn mắt:

- *Hay gặp (≥1/100 đến < 1/10):* thoáng bóng nhẹ hoặc cảm giác dính.
- *Chưa biết:* nhìn mờ.

# Dùng dịch nhỏ mắt Samil-Vidone

## THẬN TRỌNG:

### 1. Thận trọng chung:

- Nên tránh mang kính sát tròng mềm trong thời gian điều trị.
- Nếu sự kích thích do khô mắt kéo dài hoặc xấu đi, nên ngừng điều trị và bệnh nhân nên hỏi ý kiến thầy thuốc/bác sĩ chuyên khoa mắt.

### 2. Thận trọng khi dùng:

- Chỉ dùng để nhỏ mắt.
- Khi nhỏ thuốc vào mắt, cần thận trọng tránh để đầu lọ thuốc tiếp xúc trực tiếp với mắt.
- Thuốc chỉ nên được sử dụng bởi một người để phòng ngừa nhiễm bẩn thuốc.

### 3. Thận trọng khi bảo quản:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Bảo quản ở nơi khô mát tránh ánh nắng trực tiếp, với nắp được đậy kín.
- Không bảo quản trong các bao bì khác để duy trì chất lượng thuốc và tránh sử dụng sai.

## SỬ DỤNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

### 1. Sử dụng ở phụ nữ có thai:

- Chưa có dữ liệu sử dụng povidon ở phụ nữ mang thai.
- Có thể xem xét việc sử dụng thuốc nhỏ mắt povidon ở phụ nữ mang thai, nếu cần thiết.

### 2. Sử dụng ở phụ nữ cho con bú:

- Chưa rõ povidon được bài tiết vào sữa mẹ hay không.
- Tuy nhiên ảnh hưởng trên trẻ sơ sinh/trẻ nhỏ bú sữa mẹ được dự đoán là không đáng kể.

- Thuốc nhỏ mắt có thể được dùng ở phụ nữ cho con bú.

## TÁC ĐỘNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

- Trong trường hợp nhìn mờ, bệnh nhân không được lái xe hay vận hành máy móc.

## TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Nếu bệnh nhân đang sử dụng loại thuốc nhỏ mắt khác (ví dụ để điều trị glaucoma) cần phải nhỏ cách nhau ít nhất 5 phút giữa các thuốc.
- Thuốc nhỏ mắt Samilvidone nên được nhỏ cuối cùng.

## QUÁ LIỀU:

- Không có trường hợp quá liều nào được báo cáo.
- Trong trường hợp xảy ra quá nhiều, liên hệ với nhân viên y tế để trợ giúp và giải độc nếu cần thiết.
- Thuốc có thể gây độc khi nuốt phải.

## BẢO QUẢN:

- Bảo quản dưới 30°C trong lọ thuốc được đóng kín.

## HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- 02 tháng kể từ khi mở nắp chai.

*Samil*

Nhà sản xuất: **SAMIL PHARM. CO., LTD.**

216, Sandan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, **Hàn Quốc**

Mọi chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Nhà phân phối: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MÂY VÀNG**

1036/ 101 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 – 38461296

Zalo: 0911993608

Email: mayvangcompany@yahoo.com

Trang 2

