

09/138/35

SINOVA 750
Box of 30 sachets
Box: 120 x 105 x 53 mm

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT**
Lần đầu: 01/02/2013



SINOVA 750

Sachet

Glucosamine sulfate 750 mg



Oral route
Box of 30 sachets

COMPOSITION: Glucosamine sulfate 750 mg and excipients q.s. for 1 sachet 3 g.

INDICATIONS: SINOVA sachet is used for symptomatic relief of mild to moderate osteoarthritis.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 2 sachets a day in 2 divided doses, dissolved in a glass of water and taken during meals for a course of 2 - 3 months, if necessary repeat 2 - 3 courses a year.

CONTRAINDICATION AND FURTHER INFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30 °C. protect from humidity.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.

Manufacturer:
BV PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Hamlet 2, Tân Thành Village, Củ Chi District, HCMC.



SINOVA 750

Gói

Glucosamin sulfat 750 mg



Thuốc uống
Hộp 30 gói

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 750 mg và các tá dược vừa đủ một gói 3 g.

CHỈ ĐỊNH: SINOVA 750 được dùng để làm giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Mỗi ngày 2 gói, chia làm 2 lần hòa tan trong 1 ly nước và uống vào các bữa ăn. Một đợt từ 2 - 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 - 3 đợt một năm nếu cần.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Độc tố hướng dẫn sử dụng thuốc.
BAO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30 °C, tránh ẩm.
ĐỂ XA TAY TRẺ EM.
ĐỘC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Ấp 2, xã Tân Thành Tây, huyện Củ Chi, TP. HCM.



SINOVA 750

Gói

Glucosamin sulfat 750 mg

WHO - GMP

SINOVA 750
Glucosamine sulfate 750 mg
Sachet
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
H. CÚ CHI TP. HỒ CHÍ MINH
SCK/Vis: 504955/Lot No: NSK/Mid: HD/Exp:

Y TẾ
QUẢN LÝ

SINOVA 750

Box of 30 sachets


Sachets: 100 x 50 mm



BV PHARMA

SINOVA 750
Gói

Glucosamin sulfat 750 mg



Thuốc uống
Gói 3 g

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 750 mg
và các tá dược vừa đủ một gói 3 g.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Mỗi ngày 2
gói, chia làm 2 lần hòa tan trong 1 ly nước
và uống vào các bữa ăn. Một đợt từ 2 - 3
tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 -
3 đợt một năm nếu cần.

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC
THÔNG TIN KHÁC: Đọc tờ hướng dẫn sử
dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C,
tránh ẩm.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẼM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI
DÙNG.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA
Áp 2, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi,
TP. HCM.

SINOVA 750
Gói

Glucosamin sulfat 750 mg

WHO - GMP





TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

SINOVA 750 Gói

THÀNH PHẦN: Glucosamin sulfat 2KCL 995 mg (tương đương với Glucosamin sulfat 750 mg) và các tá dược gồm Manitol, Lactose monohidrat, Aspartam, Mùi cam bột, Natri Citrat, Silic dioxyd dạng keo khan, Sunset yellow, Nước tinh khiết vừa đủ 1 gói 3 g.

DẠNG BẢO CHẾ: Thuốc cốm

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 30 gói.

DƯỢC LỰC: Glucosamin là chất chủ yếu tạo nên sụn khớp, có đặc tính kích thích tạo sụn khớp, ức chế các enzym phá hủy sụn khớp và làm tăng sản xuất chất nhầy bôi trơn khớp giúp cử động được dễ dàng. Glucosamin được dung nạp rất tốt và các nghiên cứu cho thấy lợi ích của sử dụng thuốc trong điều trị thoái hóa khớp giảm được mức sử dụng liều thuốc chống viêm Non-steroid và thuốc có tác dụng kéo dài sau vài tháng.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Thuốc gói SINOVA được dùng để làm giảm triệu chứng của viêm khớp gối nhẹ và trung bình.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng: Mỗi ngày 2 gói, chia 2 lần.

Cách dùng: Hòa tan thuốc trong một ly nước và uống vào các bữa ăn, Một đợt điều trị từ 2 – 3 tháng tùy tình trạng bệnh, có thể lặp lại 2 - 3 đợt một năm nếu cần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với Glucosamin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc .
- Phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (do chưa có số liệu về độ an toàn và hiệu quả điều trị).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Đối với người cao tuổi, khi dùng lâu dài cần kiểm tra chức năng gan, thận và công thức máu định kỳ.
- Do thuốc điều trị nguyên nhân nên tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau một tuần trở đi, vì vậy nếu đau nhiều có thể kết hợp thêm thuốc giảm đau chống viêm trong những ngày đầu.
- Tuy thuốc không chứa đường nhưng do bản chất thuốc cũng nên thận trọng khi dùng cho bệnh nhân đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Người đang dùng thuốc lợi tiểu cần dùng liều lớn hơn : 20mg / kg / ngày.
- Khi dùng chung với Heparin có khả năng làm tăng nguy cơ chảy máu.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tài liệu đề cập đến.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Glucosamin không gây tác dụng phụ trên dạ dày ruột như các thuốc chống viêm không steroid.
- Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Hiếm khi gặp khó chịu ở dạ dày, nôn, ăn khó tiêu hay tiêu chảy khi đó nên uống thuốc trong bữa ăn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TÁM TAY TRẺ EM.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
NEU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.**

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

Điện thoại: 08 – 37950.611 / 957 / 994

Fax : 08 - 37950.614 **Email:** info@bvpharma.com.vn



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh