



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC - ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

**SORBITOL 5G**

**THÀNH PHẦN:** mỗi gói chứa

Sorbitol..... 5 g

**DƯỢC LỰC HỌC**

Sorbitol (D - glucitol) là một rượu có nhiều nhóm hydroxyl, có vị ngọt bằng 1/2 đường mía (sacarose). Thuốc thúc đẩy sự hydrat - hoá các chất chứa trong ruột. Sorbitol kích thích tiết cholecystokinin - pancreazym và tăng nhu động ruột nhờ tác dụng nhuận tràng thẩm thấu.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC**

Sau khi uống, sorbitol được hấp thu kém qua đường tiêu hóa. Sorbitol chuyển hóa chủ yếu ở gan thành fructose, một phản ứng được xúc tác bởi sorbitol dehydrogenase. Một số sorbitol có thể chuyển đổi thẳng thành glucose nhờ aldose reductase. Một phần nhỏ sorbitol không chuyển hóa được đào thải qua thận. Phần còn lại đào thải dưới dạng CO<sub>2</sub> khi thở qua đường hô hấp.

**CHỈ ĐỊNH**

Sorbitol được dùng trong điều trị triệu chứng khó tiêu và táo bón.

**LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG**

Chỉ được dùng với liều đơn và không thường xuyên.

*Điều trị triệu chứng khó tiêu:* Dùng thuốc trước bữa ăn hoặc khi có khó tiêu, người lớn 1 - 3 gói / ngày

*Điều trị táo bón:*

- Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, buổi sáng.
- Trẻ em dùng 1/2 liều người lớn.

*Cách dùng:* Pha 1 gói trong khoảng 50 ml nước, uống trước bữa ăn 10 phút.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**

- Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc.
- Đau bụng chưa rõ nguyên nhân.
- Người không dung nạp fructose do di truyền (bệnh hiếm gặp).

**LƯU Ý KHI DÙNG THUỐC**

- Không dùng trong những trường hợp tắc đường dẫn mật.
- Ở người bệnh "đại tràng kích thích" tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều.
- Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng. Trị táo bón bằng sorbitol chỉ để hỗ trợ cho cách điều trị bằng chế độ ăn uống.

*Nếu cần biết thêm thông tin về thuốc, xin tham khảo ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ*

**SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

Chưa có dữ liệu nghiên cứu sử dụng sorbitol cho những đối tượng này. Tham khảo ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng

**SỬ DỤNG THUỐC Ở NGƯỜI ĐANG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO**

Không có tác động ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc và làm việc trên



*[Handwritten signature]*

cao.

### **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN**

Có thể bị tiêu chảy hay đau bụng, đặc biệt ở những người bệnh có “đại tràng kích thích” hoặc trường ruột.

*Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

### **TƯƠNG TÁC THUỐC**

Do làm tăng nhu động ruột, mọi thuốc nhuận tràng có thể rút ngắn thời gian di chuyển của các loại thuốc uống cùng, do đó làm giảm hấp thu của các thuốc này.

### **QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ**

Rối loạn nước và điện giải do dùng nhiều liều lặp lại.

*Cách xử trí:* bù nước và điện giải (nếu cần).

### **KHUYẾN CÁO**

Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như: vẫn đục, có vật lạ, nấm mốc....

### **TRÌNH BÀY & BẢO QUẢN**

- Đóng trong túi màu trắng, hàn kín, gói 5 gam, hộp 20 gói.

- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. **ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM.**

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

*Thuốc được sản xuất tại*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

253 Dũng Sĩ Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

Tel : 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: [Info@danapha.com](mailto:Info@danapha.com)

Điện thoại tư vấn: 0511.3760131

*Và được phân phối trên toàn quốc*

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

