https://trungtamthuoc.com/

SUKANLOS

Thành phần

Mỗi 5 ml có chứa:

Hoạt chất: Azithromycin Dihydrate tương đương với Azithromycin .....200 mg

Tá dược: Indion Resin 214, Sucrose (Pharma Grade), Sodium Methyl Paraben, Sodium Propyl Paraben, Sodium carboxy methyl cellulose, Colloidal silicon dioxide (Aerosil), Polysorbate 60, Trisodium Phosphate, Propylene Glycol, Trusil Peppermint Special, Colour Quinoline Yellow supra, Purified water.

Tính chất dược động học

- Sau khi uống Azithromycin hấp thu nhanh và phân phối rộng vào cơ thể. Sự kết hợp của Azithromycin với protein-huyết thanh thay đổi tuỳ theo khoảng nồng độ thuốc trong cơ thể người.
- Con đường thải trừ chính là qua mật, chủ yếu dưới dạng không chuyển hoá. Trong vòng một tuần điều trị, khoảng 6% liều dùng được thải qua nước tiểu dưới dạng chưa chuyển hoá.

Tính chất dược lực học

Azithromycin tác dụng do liên kết với tiểu phân 50s của ribosom của những chủng nhạy cảm, từ đó tương tác với sự tổng hợp protein của vi khuẩn, không có ảnh hưởng tới tổng acid nucleic.

Azithromycin có hiệu lực chống lại các loại vi khuẩn sau:

- Vi khuẩn ưa khí gram dương : *Staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae*, streptococcus *agalactiae, streptococcus pyogenes.*
- Vi khuẩn ưa khí gram âm : *Haemophylus ducreyi, moraxella catarrhalis, haemophilus influenzae, neissseria gonorrhoeae.*
- Những vi khuẩn khác : *Chlamydia pneumoniae, mycoplasma pneumoniae, chlamydia trachomatis.*

https://trungtamthuoc.com/

Chỉ định

Cơn kịch phát nhiễm khuẩn cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

- Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.
- Viêm hầu viêm amidan.
- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng.
- Viêm âm đạo và viêm cổ tử cung.
- Bệnh loét bộ phận sinh dục ở nam giới.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của thầy thuốc

Liều lượng và cách dùng

Nhiễm *Chlamydia trachomatis* bộ phận sinh dục không biến chứng: uống liều duy nhất 1g Azithromycin.

Viêm tai giữa, nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn da: mỗi ngày uống 1 lần 500mg, dùng trong 3 ngày liền.

Trẻ em: mỗi ngày uống 1 lần 200mg, dùng trong 3 ngày liền.

Chống chỉ định

Chống chỉ định dùng Azithromycin ở người qua mẫn cảm với kháng sinh này hoặc với erythromycin, hoặc với bất kỳ kháng sinh nào thuộc nhóm macrolid.

Tác dụng không mong muốn

Trong thử nghiệm lâm sàng các tác dụng ngoại ý được báo cáo thường là nhẹ hoặc vừa phải có hồi phục khi ngừng thuốc. Phần nhiều những tác dụng ngoại ý là thuộc đường tiêu hoá như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng. Hiếm gặp những tác dụng ngoại ý nghiêm trọng của phủ

https://trungtamthuoc.com/

mạch và vàng da tắc mật.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Thận trọng

Thận trọng chung: Vì Azithromycin chủ yếu thải trừ qua gan, nên phải thận trọng khi dùng kháng sinh này ở người suy chức năng gan. Chưa có tài liệu thông báo về sử dụng Azithromycin ở người suy thận, vì vậy nên thận trọng khi kê đơn Azithromycin cho các đối tượng có suy thận.

Sử dụng cho người cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi mà có chức năng gan thận bình thường và dùng chế độ liều lượng nêu ở đây.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

Mang thai: Vì nghiên cứu về sinh sản ở động vật không phải bao giờ cũng dự đoán đúng về đáp ứng trên người, nên chỉ dùng Azithromycin khi mang thai khi thật sự cần thiết.

- Thời kỳ cho con bú: Vì có nhiều thuốc bài tiết được qua sữa người, nên cẩn thận trọng khi dùng Azithromycin cho người mẹ cho con bú.
- Với trẻ em: Chưa xác định được độ an toàn và hiệu lực của thuốc này ở trẻ em dưới 16 tuổi.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Không

Tương tác thuốc

Azithromycin làm tăng hàm lượng của các thuốc chuyển hoá qua hệ cytochrom P450 ở gan, như carbamazepine, terfenadine, cyclosporine, hexobarbital, phenytoin.

Phối hợp kháng sinh macrolid với theophylline làm tăng nồng độ theophylline trong huyết thanh.

https://trungtamthuoc.com/

Sử dụng quá liều

Triệu chứng quá liều:
Chưa có tư liệu về quá liều azithromycin; triệu chứng điển hình quá liều của kháng sinh macrolid thường là giảm sức nghe, buồn nôn, nôn và ỉa chảy.

Xử trí :
Rửa dạ dày, và điều trị hỗ trợ.

Đóng gói : Hộp 1lọ x 15 ml

Hạn dùng

2 năm kể từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng,

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc
Để xa tầm với của trẻ em

Nhà sản xuất
CURE MEDICINES (India) PVT. LTD.
Địa chỉ: C-12/13, M.I.D.C., Bhosari, Pune-411026, India