

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 18/01/2013

105/80.

10 ml



Farmak JSC - Ukraine

Rx Prescription only



TAKIQUI
Sterile Eye Drops

Rx Thuốc bán theo đơn. Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn Takiqui. Hộp 1 lọ 10ml dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn chứa 0,5mg Tetryzoline hydrochloride. SDK: XX-XXXX-XX. Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định, thận trọng, tác dụng phụ và các thông tin khác: xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng. Bảo quản ở dưới 30°C tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sau khi mở nắp chỉ dùng trong vòng 28 ngày.


Exp. Date/HD: dd/mm/yy
Lot No./ Số lô SX:

Anh

CMYK
Pantone 314 C



And ✓



Farmak

10 ml



823002 214666

тиснення сріблястою фольгою



*Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.*

TAKIQUI

(Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn Tetrazyline hydrochloride 0,5mg/ml)

THÀNH PHẦN

Hoạt chất: Mỗi ml dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn chứa Tetrazyline hydrochloride 0,5mg

Tà dược: Benzalkonium chloride, acid boric, natri tetraborat, natri chloride, disodium edetate, nước pha tiêm.

Asu

DƯỢC LỰC HỌC

Tetrazyline hydrochloride là chất kích thích thần kinh giao cảm, dùng nhỏ mắt có tác dụng chống phù nề, giảm dị ứng. Tetrazyline khi dùng theo đường nhỏ mắt có tác dụng kích thích thụ thể alfa adrenergic của hệ thống thần kinh giao cảm. Do đó làm co mạch và giảm phù nề ở các mô, giảm hiện tượng rát, ngứa, đau, chảy nước mắt.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Sau khi nhỏ mắt vài phút sẽ gây hiện tượng co mạch và tác dụng này kéo dài đến 4 giờ. Ở liều điều trị, thuốc chỉ có tác dụng tại chỗ và hầu như không hấp thu vào cơ thể.

CHỈ ĐỊNH

Takiqui được chỉ định trong các trường hợp sau:

Kích ứng, ngứa, phù nề và sung huyết kết mạc, rát, chảy nước mắt do các yếu tố hóa học và vật lý (bụi, mỹ phẩm, hút thuốc, bơi trong nước khử trùng bằng clo, do tiếp xúc với ánh sáng quá mức, đeo kính áp tròng), viêm kết mạc xuất tiết hoặc không đặc hiệu.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- Trẻ em từ 2 – 6 tuổi: chỉ dùng nếu có chỉ định của bác sĩ. Nếu không có hướng dẫn liều dùng đặc biệt, liều thông thường cho lứa tuổi này là 1 giọt vào mỗi mắt, 1 lần mỗi ngày.

- Trẻ từ 6 tuổi trở lên và người lớn: Nhỏ 1 hoặc 2 giọt vào mỗi mắt, 2-3 lần mỗi ngày.

Không sử dụng sản phẩm này cho hơn 3 ngày liên tiếp. Nếu quá 48 giờ mà các triệu chứng không có dấu hiệu thuyên giảm, cần ngưng dùng thuốc và khám lại.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Trẻ em dưới 2 tuổi

- Không sử dụng ở bệnh nhân bị tăng nhãn áp hoặc loạn dưỡng nội mô biểu bì giác mạc.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC



Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân cao huyết áp, cường giáp, rối loạn tim, tiểu đường và bệnh nhân đang dùng các thuốc ức chế monoamino-oxidase (tranylcypromine, phenelzine, pargyline). Nên bỏ kính áp tròng trước khi sử dụng Takiqul, vì thuốc có thể làm giảm độ trong suốt của kính áp tròng. Sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt, cần đợi 5 phút trước khi sử dụng kính áp tròng.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Có thể sử dụng kết hợp với các lọ thuốc nhỏ mắt khác nhưng không sớm hơn 15 phút sau khi sử dụng Takiqul. Chế phẩm không tương thích với các thuốc ức chế monoamino-oxidase.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Do các nghiên cứu về việc sử dụng thuốc cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú còn hạn chế, nên thận trọng và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết và phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Hiếm khi xảy ra tình trạng giãn đồng tử và mờ mắt sau khi nhỏ thuốc. Nếu tình trạng này xảy ra, có thể ảnh hưởng khả năng lái xe và vận hành máy móc. Vì vậy nên tránh dùng thuốc nếu bệnh nhân đang phải lái xe hoặc vận hành máy móc.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

Nhìn chung thuốc không gây tác dụng toàn thân.

Đôi khi, việc sử dụng của sản phẩm có thể gây giãn đồng tử, tăng áp lực nội nhãn, buồn nôn và đau đầu. Hiện tượng mẫn cảm với thành phần của thuốc có thể xảy ra nhưng hiếm. Cao huyết áp, rối loạn tim mạch hoặc tăng đường huyết chỉ có thể xảy ra khi sử dụng ở liều rất cao. Có thể xảy ra tình trạng không dung nạp thuốc ở một số cá thể. Trong những trường hợp này, nên ngừng dùng thuốc.

Ghi chú: XIN THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CÁC TÁC DỤNG NGOẠI Ý GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Điều trị lâu dài với liều rất cao có thể gây hiện tượng ngộ độc. Ở trẻ em, có nguy cơ dùng quá liều đặc biệt nếu vô ý uống phải. Những dấu hiệu của quá liều là ngủ lịm, buồn ngủ hoặc cũng có thể bị kích thích, nhịp tim và huyết áp bất thường, thay đổi nhiệt độ cơ thể.

Đối với trẻ em, nếu vô ý uống phải thuốc này, có thể bị ngủ mê và giảm trương lực.

Phương pháp điều trị: ngưng dùng thuốc và điều trị triệu chứng.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Ph. Eur.

HẠN DÙNG

2 năm kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp chỉ dùng thuốc trong vòng 28 ngày.

KHÔNG DÙNG THUỐC QUÁ THỜI HẠN GHI TRÊN NHÃN

BẢO QUẢN

Giữ thuốc ở dưới 30°C, tránh ánh sáng.

GIỮ THUỐC XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



TRÌNH BÀY
Hộp 1 lọ 10ml

NHÀ SẢN XUẤT
Farmak JSC
63 Frunze str., Kiev, 04080, Ukraine

Handwritten signature

Handwritten signature

