

30/158

THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT SXH

(15 gói)

Box: 105 x 53 x 55 mm
Sachet: 100 x 50 mm



THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT

SXH

Cốm tan

Hộp 15 gói x 5,5 g



CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, mất gàu, mất mụn, giảm ngứa, được dùng để:
- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết.
- Có thể dùng kết hợp với Y học hiện đại trong điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2, sau khi được bác sĩ thăm khám và quyết định.
- Dùng uống để phòng bệnh sốt xuất huyết trong vùng đang có dịch bệnh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Trẻ em từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 100 ml) trước khi uống.
- Trẻ em từ 6 - 14 tuổi: Uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 50 ml) trước khi uống.
- Những hợp phòng bệnh Phas 2 - 3 gói trong 1 lít nước để dùng hàng ngày thay nước uống.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Ng 2, xã Tân Thành Mỹ, huyện Gò Dầu, TP HCM

WHO-GMP

Cốm tan

Hộp 15 gói x 5,5 g



SDK/Misa:
Số lô SX/Lot No.:
NSX/Mfd:
HD/Exp:

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 22-06-2017

THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT



THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT

SXH

Cốm tan

Hộp 15 gói x 5,5 g



CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, mất gàu, mất mụn, giảm ngứa, được dùng để:
- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết.
- Có thể dùng kết hợp với Y học hiện đại trong điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2, sau khi được bác sĩ thăm khám và quyết định.
- Dùng uống để phòng bệnh sốt xuất huyết trong vùng đang có dịch bệnh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Trẻ em từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 100 ml) trước khi uống.
- Trẻ em từ 6 - 14 tuổi: Uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 50 ml) trước khi uống.
- Những hợp phòng bệnh Phas 2 - 3 gói trong 1 lít nước để dùng hàng ngày thay nước uống.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Ng 2, xã Tân Thành Mỹ, huyện Gò Dầu, TP HCM

WHO-GMP

Cốm tan

Hộp 15 gói x 5,5 g



THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT

SXH

Cốm tan | Gói 5,5 g

Số lô SX/Lot No.:
HD/Exp:

THÀNH PHẦN: Mỗi gói chứa 3,5 g cao thảo mộc theo chi tiết được liệt kê dưới đây (theo *Herba Edible*) sau vàng:
Bạch mã căn (*Rhizoma Imperatae cylindrica*) 6,5 g
Sài đất (*Herba Wedelia*) 4,0 g
Kim ngân (*Cassia cum folium laetevire*) 6,5 g
Hạt thảo (*Sida spinosa*) 4,0 g
Hạt thảo (*Sida spinosa*) 3,3 g
Sinh khương (*Rhizoma Zingiberis recens*) 3,2 g

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Bạc từ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm, để xa tầm tay trẻ em.
ĐƯỢC KINH DOANH TẠI CÁC NHÀ THUỐC KHI DÙNG.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:
Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, mất gàu, mất mụn, giảm ngứa, được dùng để:
- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết.
- Có thể dùng kết hợp với Y học hiện đại trong điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2, sau khi được bác sĩ thăm khám và quyết định.

Nhà sản xuất: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA**
Ng 2, xã Tân Thành Mỹ, huyện Gò Dầu, TP HCM

WHO-GMP

THANH NHIỆT CHỈ HUYẾT SXH

Cốm tan

I/ PHẦN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO BỆNH NHÂN

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

THÔNG BÁO NGAY CHO BÁC SĨ HOẶC ĐƯỢC SĨ NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG THUỐC.

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

THÀNH PHẦN: Mỗi gói chứa 3,5 g cao khô hỗn hợp dược liệu chiết được từ 40 g các dược liệu khô sau:

Cỏ nhọ nổi	(<i>Herba Ecliptae</i>) sao vàng	6,5 g
Cối xay	(<i>Herba Abutili indic</i>) sao vàng	4,0 g
Bạch mao căn	(<i>Rhizoma Imperatae cylindrica</i>)	6,5 g
Sài đất	(<i>Herba Wedeliae</i>)	6,5 g
Kim ngân	(<i>Caulis cum folium Lonicerae</i>)	4,0 g
Hạ khô thảo	(<i>Spica Prunellae</i>) sao	4,0 g
Hòe hoa	(<i>Flos Styphnolobii japonici imaturi</i>)	3,3 g
Sinh khương	(<i>Rhizoma Zingiberis recens</i>)	5,2 g

Các tá dược: Đường trắng, maltodextrin, silic dioxyd dạng keo khan và aspartam vừa đủ.

MÔ TẢ SẢN PHẨM: Thuốc được sản xuất ở dạng cốm tan (chế phẩm dạng cốm, có màu nâu xám, mùi thơm dược liệu, vị đắng nhẹ).

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 15 gói x 5,5 g

THUỐC NÀY DÙNG CHO BỆNH GÌ ?

Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, mát gan, mát máu, cầm máu. Được dùng để

- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết.
- Có thể dùng kết hợp với Y học hiện đại trong điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2 sau khi được bác sĩ thăm khám và quyết định.
- Dùng uống dự phòng bệnh sốt xuất huyết trong vùng đang có dịch bệnh.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?

Liều lượng:

- Trẻ em từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 100 ml) trước khi uống.
- Trẻ em từ 6 – 14 tuổi: Mỗi lần uống ½ gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 50 ml) trước khi uống.
- Trường hợp phòng bệnh: Pha 2 - 3 gói trong 1 lít nước để dùng hàng ngày thay nước uống.

Cách dùng: Dùng qua đường uống, hòa tan trong nước ấm trước khi uống.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY ?

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Nhũ nhi và trẻ em dưới 5 tuổi.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC: Không có báo cáo.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Không có báo cáo.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC ?

Nếu quên một lần không dùng thuốc thì uống bù ngay một liều thuốc khi bạn nhớ ra, ngoại trừ lúc đó đã sát gần thời điểm phải uống liều thuốc tiếp theo. Không được uống 2 liều thuốc cùng một lúc. Các liều thuốc còn lại nên uống cho đúng giờ.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO ?

Thuốc này cần được bảo quản nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU.

Không có báo cáo về sử dụng quá liều.

CẦN LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO;

Nếu như lỡ dùng thuốc quá liều cần báo cáo ngay với bác sĩ của bạn hay đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí thích hợp.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

- Dùng thận trọng cho người có tỳ vị hư hàn, không thực nhiệt, tiêu phân sống.
- Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước để tăng cường hiệu quả.
- Dùng thuốc thận trọng cho phụ nữ mang thai.
- Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái tàu xe, vận hành máy móc.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ ?

Khi bạn có điều chi thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, đừng ngần ngại hỏi ngay ý kiến của bác sĩ.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARMA

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: / / 2016

II/ PHÂN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ

DƯỢC LỰC HỌC:

Sản phẩm này gồm các vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết, chỉ huyết, tức là giúp loại trừ nhiệt độc, giúp làm mát máu và cầm máu. Thuốc có thể ứng dụng trong hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết giai đoạn sớm và giai đoạn 2 bằng Y học cổ truyền và có thể dùng để uống hàng ngày để phòng bệnh trong vùng có dịch (tham khảo theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y Tế, ban hành kèm theo QĐ số 1537/QĐ – BYT năm 2014).

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc, mát gan, mát máu, cầm máu. Được dùng để

- Hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue giai đoạn sớm từ ngày thứ 3 trở đi bị sốt cao và có xuất huyết.
- Có thể dùng kết hợp với Y học hiện đại trong điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2 sau khi được bác sĩ thăm khám và quyết định.
- Dùng uống dự phòng bệnh sốt xuất huyết trong vùng đang có dịch bệnh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng:

- Trẻ em từ 15 tuổi trở lên và người lớn: Mỗi lần uống 1 gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 100 ml) trước khi uống.
- Trẻ em từ 6 – 14 tuổi: Mỗi lần uống ½ gói, 3 lần mỗi ngày. Hòa tan trong 1 cốc nước ấm (khoảng 50 ml) trước khi uống.
- Trường hợp phòng bệnh: Pha 2 - 3 gói trong 1 lít nước để dùng hàng ngày thay nước uống.

Cách dùng: Dùng qua đường uống, hòa tan trong nước ấm trước khi uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Nhũ nhi và trẻ em dưới 5 tuổi.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

- Dùng thận trọng cho người có tỳ vị hư hàn, không thực nhiệt, tiêu phân sống.
- Trong thời gian dùng thuốc nên uống nhiều nước để tăng cường hiệu quả.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái tàu xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC

Không có báo cáo

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Không có báo cáo

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không có báo cáo về sử dụng quá liều



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng

