

MẪU HỘP THÔNG XOANG ACP

KT: 125 x 75 x 40 mm



MẪU VỈ THÔNG XOANG ACP

KT: 89 x 57 mm

Thông Xoang ACP

SDK:



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
521- An Lợi - Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương
Theo hợp đồng gia công với:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Thông Xoang ACP

SDK:



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
521- An Lợi - Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương
Theo hợp đồng gia công với:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Thông Xoang ACP

SDK:



Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ME DI SUN
521- An Lợi - Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương
Theo hợp đồng gia công với:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU
Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Thông Xoang ACP

Số lô SX:

HD:



GIÁM ĐỐC

Ds: *Phạm Phan Thanh Vân*

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên nang THÔNG XOANG ACP

Trình bày : Vỉ 10 viên nang cứng. Hộp 5 vỉ + HDSD.

Công thức cho 1 viên nang cứng:

Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae)	0,27g (tương đương 195mg bột mịn.)
Phòng phong (Radix Ledebouriellae seseloidis)	0,15g (tương đương 20mg cao khô.)
Hoàng cầm (Radix Scutellariae)	0,25g (tương đương 50mg cao khô.)
Ké đầu ngựa (Fructus Xanthii Strumarrii)	0,25g (tương đương 25mg cao khô.)
Hạ khô thảo (Spica Prunellae)	0,25g tương đương 26mg cao khô.)
Cỏ hôi (Herba Agerati conyzoidis)	0,35g tương đương 50mg cao khô.)
Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)	0,25g (tương đương 170mg bột mịn.)
Tá dược (Magnesi stearat , Talc)	vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

- Viêm mũi dị ứng, biểu hiện: Hắt hơi liên tục, ngứa mũi, mũi hay chảy nước vàng đục, mùi hôi tanh ngọt ngạt...
- Viêm xoang, viêm đa xoang(xoang trán, xoang mũi, xoang bướm, xoang sàng...) biểu hiện: đau nhức đỉnh đầu, ổ mắt, hàm trên, sau gáy; vùng trán và thái dương bứt rứt, khó chịu, đầu choáng váng, mắt hoa, hay quên, tinh thần mệt mỏi

Chống chỉ định:

Trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai, người mẫn cảm với thuốc.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: Uống 3 viên/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em trên 2 tuổi : Uống 1 viên/lần, 3 lần/ngày.

Thời gian điều trị: ít nhất là 30 ngày, người bệnh nặng có thể dùng lâu hơn.

Kiêng kỵ:

Các thứ cay, hăng, nóng và các thứ rượu, bia.

Người đang lao động, vận hành máy móc tàu xe:

Thuốc không ảnh hưởng gì với người đang lao động, vận hành máy móc tàu xe.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có báo cáo.

Thông báo với bác sĩ các tác dụng không muốn gặp phải của thuốc.

Quá liều và xử trí:

Chưa có báo cáo.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.



<https://trungtamthuoc.com/>

Bảo quản: Để nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30⁰C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDISUN

Địa chỉ: Số 521- An Lợi- Hòa Lợi- Bến Cát- Bình Dương

Tel: 0650.3589036; Fax :0650.3589297; Email: medisun.medisun@gmail.com

Theo hợp đồng gia công với:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC Á CHÂU

Địa chỉ: Do Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội



GIÁM ĐỐC

Ds: Phạm Phan Thanh Vân

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

