

MẪU NHÃN DỰ KIẾN

NHÃN HỘP

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 19/9/14



THÀNH PHẦN

Mỗi viên nén chứa : 4200 đơn vị Chymotrypsin USP

Chỉ định, cách dùng & liều dùng, chống chỉ định, lưu ý & thận trọng, tác dụng không mong muốn: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

Lô 27, 3A, KCN Biên Hòa II,
TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Rx

Prescription only

Trigenic®
4200 USP Chymotrypsin Units

Box of 2 blisters x 10 tablets

COMPOSITION:

Each tablet contains : 4200 USP Chymotrypsin Units

Indications, administration and dosage, contraindications, warnings and precautions, side effects, interactions:
See the insert

Keep out of reach of children

Read carefully the enclosed insert before use.

Store at temperature below 30°C, in a dry place, protect from light.

OPV PHARMACEUTICAL JOINT STOCK CO.

Lô 27, 3A, Bien Hoa Industrial Zone II,
Bien Hoa City, Dong Nai, Vietnam

Số lô SX/ Lot N°:
NSX/ Mfg. Date:
HD/ Exp. Date:

NHÃN VỈ



Tp.HCM Ngày 19 tháng 8 năm 14
Phụ Trách Nghiên Cứu & Phát Triển



Đỗ Văn Hoàng

R_x Thuốc bán theo đơn



THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:

Hoạt chất:

Chymotrypsin4200 đơn vị chymotrypsin USP.

Tá dược: Đường đập thẳng (compressible sugar), magnesi stearat, bột bạc hà.

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Viên nén tròn, màu trắng, mùi thơm bạc hà, vị ngọt.

DƯỢC LỰC HỌC:

Chymotrypsin có tác dụng chống phù nề và kháng viêm dạng men. Như một thuốc kháng viêm, chymotrypsin và các men tiêu protein khác ngăn chặn tổn thương mô trong quá trình viêm và hình thành sợi tơ huyết. Men tiêu protein tham gia vào quá trình phân hủy sợi tơ huyết được gọi là quá trình tiêu sợi huyết. Sợi tơ huyết hình thành lớp rào bao quanh vùng viêm gây tắc nghẽn mạch máu và mạch bạch huyết dẫn đến hiện tượng phù nề tại vùng viêm. Sợi tơ huyết cũng có thể phát triển thành các cục máu đông.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Chymotrypsin là một men thủy phân các protein. Chymotrypsin được hấp thu qua đường uống hoặc đường ngậm dưới lưỡi và thuốc vẫn hoạt động chức năng trong máu kéo dài 4 giờ sau khi dùng thuốc. Chymotrypsin tham gia vào quá trình phân hủy sợi tơ huyết mà được hình thành trong quá trình viêm.

CHỈ ĐỊNH:

- Thuốc được sử dụng để điều trị các trường hợp phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

- Uống: 2 viên / lần x 3-4 lần / ngày.
- Ngậm dưới lưỡi: 4 – 6 viên / ngày, chia làm nhiều liều nhỏ (thuốc sẽ tan và hấp thu từ từ dưới lưỡi).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với chymotrypsin và các thành phần khác của thuốc.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:

Vì khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi. Không dùng chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc bệnh nhân đục nhân mắt bẩm sinh.

Phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Tham khảo kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Phản ứng dị ứng với chymotrypsin có thể hiếm khi xảy ra mà dẫn đến việc ngưng dùng thuốc.
- Tăng nhãn áp nhất thời.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Chưa có báo cáo.

TRÌNH BÀY:

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

THỜI GIAN XÉT LẠI TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Nhà sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV

Lô 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (061) 3992999

Fax: (061) 3835088



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng

W

ĐƯỢC

