

NHÃN HỘP TRYPSINMED 8400

Kích thước

(Hộp 2 vỉ Alu/Alu x 10 viên)

Dài : 117 mm

Rộng : 15 mm

Cao : 50 mm



Ngày 14 tháng 01 năm 2016

P. Tổng Giám Đốc



NHÃN HỘP TRYPSINMED 8400

Kích thước

(Hộp 5 vỉ Alu/Alu x 10 viên)

Dài : 117 mm

Rộng : 32 mm

Cao : 50 mm

R_x Prescription only

TRYPSINMED[®]
Chymotrypsin 8400 USP units **8400**



Oral route or sublingual

Box of 5 blisters of 10 tablets

COMPOSITION: Each tablet contains Chymotrypsin 8400 USP units. Excipients q.s 1 tablet.

INDICATIONS, DOSAGE, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND OTHER

INFORMATION: Please refer to the package insert.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE.

STORAGE: Store at the temperature not more than 30°C, in a dry place, protect from light.

Manufactured by: **GLOMED PHARMACEUTICAL COMPANY, Inc.**

35 Tu Do Boulevard, Vietnam-Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.

Số lô SX / Batch No.:
NSX / Mfg. Date:
HD / Exp. Date:

R_x Thuốc bán theo đơn

TRYPSINMED[®]
Chymotrypsin 8400 đơn vị USP **8400**



Uống hoặc ngậm dưới lưỡi

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Chymotrypsin 8400 đơn vị USP. Tã được vừa đủ 1 viên.

CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ SẢN

PHẨM: Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

SĐK/ Reg No.:

Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED**

35 Đại Lộ Tự Do, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.



Ngày 14 tháng 01 năm 2016

P. Tổng Giám Đốc



Trang Văn Ty

NHÃN VỈ TRYPSINMED 8400

Kích thước (vỉ Alu/PVC-PVDC 10 viên nén)

Dài: 97 mm

Rộng: 37 mm



Ngày 14 tháng 04 năm 2016
P. Tổng Giám Đốc

Trang Văn Tý

NHÃN HỘP TRYPSINMED 8400

Kích thước (Hộp 2 vỉ Alu/PVC-PVDC x 10 viên)

Dài : 101 mm

Rộng : 15 mm

Cao : 41 mm



Ngày 14 tháng 04 năm 2016

P. Tổng Giám Đốc

Trang Văn Ty

NHÃN HỘP TRYPSINMED 8400

Kích thước (Hộp 5 vỉ Alu/PVC-PVDC x 10 viên)

Dài : 101 mm

Rộng : 35 mm

Cao : 41 mm



Ngày 14 tháng 04 năm 2016
P. Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
TX. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Trang Văn Ty

NHÃN HỘP TRYPSINMED 8400

Kích thước

Dài : 101 mm

Rộng : 41 mm

Cao : 62 mm

(Hộp 10 vỉ Alu/PVC-PVDC x 10 viên)



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Rx Thuốc bán theo đơn

TRYPSINMED® 8400

Chymotrypsin
Viên nén

1. Thành phần

Mỗi viên nén chứa:

Hoạt chất: Chymotrypsin 8400 đơn vị USP.

Tá dược: Đường đập thẳng, menthol, polyethylen glycol 400, sucralose, magnesi stearat, silic dioxyd thể keo.

2. Dược lực học và dược động học

Dược lực học

Chymotrypsin là enzym thủy phân protein được sử dụng đường uống có tác dụng làm giảm tình trạng viêm và phù nề trên mô mềm do phẫu thuật hay chấn thương.

Dược động học

Không có báo cáo về dược động học của chymotrypsin.

3. Chỉ định

Chống phù nề và kháng viêm dạng men tác động trên mô mềm.

Điều trị các trường hợp phù nề sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật.

4. Liều dùng và cách dùng

Uống: 1 viên / lần, 3-4 lần / ngày.

Ngậm dưới lưỡi: 2 - 3 viên mỗi ngày, chia làm nhiều lần (để viên thuốc tan từ từ dưới lưỡi).

5. Chống chỉ định

Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

6. Lưu ý và thận trọng

Không nên dùng chung với bất kỳ thuốc khác có chứa chymotrypsin.

Vì khả năng gây mất dịch kính, nên không khuyến cáo dùng chymotrypsin trong phẫu thuật đục nhân mắt ở người bệnh dưới 20 tuổi. Không dùng chymotrypsin cho người bệnh tăng áp suất dịch kính và có vết thương hở hoặc người bệnh đục nhân mắt bẩm sinh.

Sử dụng trên phụ nữ có thai và cho con bú: An toàn của thuốc trong thai kỳ và trong thời gian cho con bú chưa được thiết lập. Nên thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng điều khiển tàu xe và vận hành máy móc: Không có báo cáo.

7. Tác dụng không mong muốn

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất của chymotrypsin là tăng nhất thời nhãn áp do các mảnh vụn dây chằng bị tiêu hủy làm tắc mạng bỏ dấy. Dùng trong nhãn khoa, có thể gặp phù giác mạc, viêm nhẹ màng bồ đào.

Hiếm khi xảy ra các phản ứng dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

8. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác

Không có báo cáo.

9. Quá liều và xử trí

Thông tin về quá liều chymotrypsin chưa được rõ ràng.

10. Dạng bào chế và đóng gói

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén.

11. Điều kiện bảo quản

Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THUỐC BÁN THEO ĐƠN
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

Sản xuất bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GLOMED
Địa chỉ: Số 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650. 3768824 Fax: 0650. 3769095



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Minh Hùng



Ngày 14 tháng 04 năm 2016

P: Tổng giám đốc

Trang Văn Cử