

[illegible]

Cao đặc tổng hợp 245mg tương đương với đặc liệu:

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng
nhiệt độ không quá 30°C

HAN DŨNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất
TIÊU CHUẨN: TCCS

XGS

Tùng Lộc
ĐIỀN
KINH



HỎA SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

ĐC: Xã Trung Trú - Huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321.3860593 - 04.38513566 - Website: tungloc.com.vn

LÔ SX:

NSX:

HSD:



CÁCH DÙNG:

CHI GIÒ

Kính nguyệt không đều, ngực, bụng đau
bứt dứt khó chịu.

Người lớn: ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên
Uống trước khi ăn khoảng 30 phút
Hoặc theo chỉ định của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬT TRỌNG:
Không dùng quá liều chỉ định.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Tùng Lộc
ĐIÊN
KINH



Ả SẠN XUẤT

CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

ĐC: Xã Thượng Tiến - Huyện Yên Lôm - Tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321.3980593 - 04.38513506 - Website: tangloc.com.vn





TÙNG LỘC
Công ty TNHH D
SPK:

TÙNG LỘC ĐIỀU KIỆN
Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II
SPK:

TÙNG LỘC
Công ty TNHH D
SPK:

ỐC ĐIỀU KIỆN
Dược Tùng Lộc II

TÙNG L
ốc II

Handwritten signature

TÙNG L
Công ty TNHH
SPK:

TÙNG LỘC ĐIỀU KIỆN
Công ty TNHH Dược Tùng L
SPK:

TÙNG LỘC ĐIỀU KIỆN
Công ty TNHH Dược Tùng L
SPK:

TÙNG LỘC ĐIỀU
TNHH D

NSX

HSD

Tùng Lộc

ĐIỀU KINH

CÔNG THỨC

(CHO 1 VIÊN NANG CỨNG)

Cao đặc tổng hợp 245mg tương đương với dược liệu:

Xuyên Khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>).....	450 mg
Thược Dược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>).....	450 mg
Thục Địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>).....	450 mg
Mẫu Đơn Bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>).....	450 mg
Hương Phụ (<i>Rhizoma Cyperi</i>).....	450 mg
Đương Quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>).....	450 mg
Bạch Truật (<i>Rhizoma Atractylodis macrocephalae</i>).....	450 mg
Địa Cốt Bì (<i>Cortex Lycii</i>).....	300 mg

(Tá dược: Natri benzoat, magnesi carbonat, eragel, tale, aerosil 200) vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

Kinh nguyệt không đều, ngực, bụng đau bứt dứt khó chịu.

Liều dùng - Cách dùng:

Người lớn: ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên, uống trước khi ăn khoảng 30 phút.
Hoặc theo chỉ định của thầy thuốc.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có thông tin

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc

Phụ nữ đang cho con bú: Dùng được

Người đang vận hành máy móc tàu xe: Dùng được

Thận trọng: Không dùng quá liều chỉ định

Quá liều và xử trí: Trong trường hợp quá liều, thông báo và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên hoặc hộp 5 vỉ x 10 viên

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sỹ



**NHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II**

ĐỊA CHỈ: XÃ TRUNG TRẮC - HUYỆN VĂN LÂM - TỈNH HƯNG YÊN

ĐT: 0321 3980593 - Website: tungloc.com.vn

Điện thoại tư vấn khách hàng: 043. 8513566



TU. CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Đỗ Minh Hùng