

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/3/2016

ech



10 vỉ x 10 viên nén bao phim

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
ngọt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



10 blisters x 10 film coated tablets

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING



Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim



20 vỉ x 10 viên nén bao phim

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

vacopharm

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Lâm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
ngheht phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tằm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

GMP WHO

20 blisters x 10 film coated tablets

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

vacopharm

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com**

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim



50 vỉ x 10 viên nén bao phim



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN

Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
ngheht phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tắmm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



50 blisters x 10 film coated tablets



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com**

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim



100 vỉ x 10 viên nén bao phim



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

llh

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Lâm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
nghệt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



100 blisters x 10 film coated tablets



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING



Eprazinon dihydroclorid 50mg

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 2 vỉ x 15 viên nén bao phim



2 vỉ x 15 viên nén bao phim

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
nghech phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



2 blisters x 15 film coated tablets

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING**

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com**

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Hộp 10 vỉ x 15 viên nén bao phim

lkh



**turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

10 vỉ x 15 viên nén bao phim

**turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Lâm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
ngheet phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tắmm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



**turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

10 blisters x 15 film coated tablets

**turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 20 vỉ x 15 viên nén bao phim

le

20 vỉ x 15 viên nén bao phim

 **turanon**[®] Eprazinon dihydroclorid 50mg





ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN

Eprazinon dihydroclorid 50mg

Tá dược v.v 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Lâm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
ngheet phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.

Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Phụ nữ cho con bú

Để xa tằm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



20 blisters x 15 film coated tablets



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường

Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 50 vỉ x 15 viên nén bao phim

11/11





50 vỉ x 15 viên nén bao phim

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

GMP WHO

50 blisters x 15 film coated tablets

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com**

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 100 vỉ x 15 viên nén bao phim

leh





100 vỉ x 15 viên nén bao phim



turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
nghệt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



100 blisters x 15 film coated tablets



turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING



Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim

ellh





5 vỉ x 20 viên nén bao phim

 **turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH: Lâm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
nghệt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



5 blisters x 20 film coated tablets

 **turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG





turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

10 vỉ x 20 viên nén bao phim



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN

Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C



10 blisters x 20 film coated tablets



turanon[®]

Eprazinon dihydroclorid 50mg



KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Hộp 25 vỉ x 20 viên nén bao phim

Handwritten signature





25 vỉ x 20 viên nén bao phim

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ
ngheht phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

GMP WHO

25 blisters x 20 film coated tablets

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING

turanon[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 50 vỉ x 20 viên nén bao phim

llh





50 vỉ x 20 viên nén bao phim

 **turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



**ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG**

THÀNH PHẦN Eprazinon dihydroclorid 50mg Tá dược v.d 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghech phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.	CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật. Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ cho con bú Để xa tằm tay trẻ em Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 
--	---

50 blisters x 20 film coated tablets

 **turanon**[®]
Eprazinon dihydroclorid 50mg



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USING**

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**
www.vacopharm.com

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

GMP WHO

100 viên nén bao phim

turanon®

Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

200 viên nén bao phim

turanon®

Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 250 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

250 viên nén bao phim

turanon®

Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

500 viên nén bao phim

turanon®

Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Eprazinon dihydroclorid 50mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH: Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Tiền sử co giật.
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Phụ nữ cho con bú

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

1000 viên nén bao phim

turanon®

Eprazinon dihydroclorid 50mg

vacopharm

vacopharm

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

TURANON

Thành phần

Eprazinon dihydroclorid 50mg

Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

(Lactose, Tinh bột sắn, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri lauryl sulfat, Magnesi stearat, Talc, Natri starch glycolat, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Polyethylen glycol 6000, Erythrosin lake, Ponceau lake)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 2 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 10 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 20 vỉ
8	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 50 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 100 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
10	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 5 vỉ
11	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ
12	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ
13	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ
14	Đóng chai 100 viên
15	Đóng chai 200 viên
16	Đóng chai 250 viên
17	Đóng chai 500 viên
18	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Eprazinon dihydroclorid: dẫn chất của piperazin, có hoạt tính phân hủy chất nhầy nhớt hay long đàm, do gắn kết với receptor của chất nhầy nơi bị viêm. Ngoài ra, Eprazinon còn có tác dụng giãn cơ trơn phế quản.

Dược động học

Thuốc hấp thu qua đường uống, nồng độ thuốc đạt được trong huyết tương sau 1 giờ.

Thuốc được chuyển hóa chủ yếu qua gan (bề gãy alkyl).

Thời gian bán thải khoảng 6 giờ.

Chỉ định

Làm loãng dịch tiết phế quản trong các trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp.

Liều dùng và cách dùng

Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Thời gian điều trị không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của Bác sĩ

Chống chỉ định

Tiền sử co giật.

Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Phụ nữ cho con bú.

Thận trọng

Phối hợp trị liệu trong trường hợp: đàm đặc, có mủ hoặc sốt, bệnh phổi hoặc phế quản mãn tính.

Không dùng kèm thuốc giảm ho hoặc thuốc làm khô chất tiết phế quản trong khi sử dụng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú: chỉ dùng trong thời kỳ mang thai khi thật sự cần thiết. Phụ nữ cho con bú: không được dùng.



Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc có thể gây buồn ngủ, sử dụng thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Có thể gây rối loạn tiêu hóa: đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy.

Hiếm khi gây ra dị ứng da, nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Không phối hợp với thuốc ức chế ho hay thuốc làm giảm tiết dịch.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng: buồn ngủ, mất điều hòa vận động, co giật.

Xử trí: điều trị triệu chứng.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô mát, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

kh

Công ty cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311

**Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An**

Long An, ngày 15 tháng 7 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu



TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Lỗ Minh Hùng