


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 24/9/2012

1 vỉ x 10 viên bao phim



Avacopharm

Vaco Loratadine's
Desloratadin 5mg

THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/ngẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như giảm ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.


CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



1 vỉ x 10 viên bao phim



Avacopharm

Vaco Loratadine's
Desloratadin 5mg



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.d 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/nghẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày dáy như ngứa mắt, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

llh

3 vỉ x 10 viên bao phim

Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg




Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/nghẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg



3 vỉ x 10 viên bao phim

Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg





Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

5 vỉ x 10 viên bao phim

Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg




Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/nghet mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như giảm ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



5 vỉ x 10 viên bao phim

Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg





Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

llh



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/nghet mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

100 vỉ x 10 viên bao phim

Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg




THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Handwritten initials: mlu

THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/ngheẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như giảm ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Thấy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



100 vỉ x 10 viên bao phim

Vaco Loratadine's

Desloratadin 5mg




THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



THÀNH PHẦN

Desloratadin 5mg
Tá dược v.đ 1 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/nghẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày dầy như giảm ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.



Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 □ Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Nhãn vỉ



Nhãn chai 60 viên bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.d 1 viên bao phim
CHỈ ĐỊNH: Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/ngheť mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.
Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.
Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.
Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.
Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thày thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem trong tờ HDSD

60 viên bao phim

Vaco Loratadine's
Desloratadin 5mg

GMP WHO

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Nhãn chai 100 viên bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.d 1 viên bao phim
CHỈ ĐỊNH: Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/ngheť mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.
Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.
Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.
Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.
Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thày thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem trong tờ HDSD

100 viên bao phim

Vaco Loratadine's
Desloratadin 5mg

GMP WHO

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Nhãn chai 200 viên bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.d 1 viên bao phim
CHỈ ĐỊNH: Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/ngheť mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.
Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.
Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.
Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.
Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thày thuốc.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem trong tờ HDSD

200 viên bao phim

Vaco Loratadine's
Desloratadin 5mg

GMP WHO

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Nhãn chai 500 viên bao phim

THÀNH PHẦN
Desloratadin 5mg
Tá dược v.d 1 viên bao phim
CHỈ ĐỊNH: Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/ngheť mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.
Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.
Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày.

500 viên bao phim

Vaco Loratadine's
Desloratadin 5mg

GMP WHO

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 • Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SDK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Viên bao phim VACO LORATADINE'S

Thành phần

Desloratadin

5mg

Tá dược v.đ

1 viên bao phim

(Lactose, Tinh bột sắn, Talc, Magnesi stearat, Polyvinyl pyrrolidon, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropyl methylcellulose, Erythrosin lake, Titan dioxyd, Ethanol 96%)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vi, vi 4 viên, hộp 25 vi
2	Ép vi, vi 10 viên, hộp 1 vi
3	Ép vi, vi 10 viên, hộp 2 vi
4	Ép vi, vi 10 viên, hộp 3 vi
5	Ép vi, vi 10 viên, hộp 5 vi
6	Ép vi, vi 10 viên, hộp 10 vi
7	Ép vi, vi 10 viên, hộp 100 vi
8	Chai 60 viên
9	Chai 100 viên
10	Chai 200 viên
11	Chai 500 viên

Dược lực học

Desloratadin là chất chuyển hóa chính có hoạt tính theo đường uống của Loratadin, là thuốc kháng histamin có tác dụng kéo dài, đối kháng chọn lọc trên thụ thể H₁ ngoại biên và không thấm vào hệ thần kinh trung ương.

Dược động học

Desloratadin được hấp thu tốt qua đường uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt 3 giờ sau khi uống, sinh khả dụng không bị ảnh hưởng bởi thức ăn.

Desloratadin được chuyển hóa mạnh thành 3-hydroxydesloratadin có hoạt tính sau đó được chuyển hóa ở dạng glucuronid. Khoảng 82-87% Desloratadin và khoảng 85-89% chất chuyển hóa 3-hydroxydesloratadin gắn vào protein huyết tương.

Thời gian bán thải trung bình của desloratadin là 27 giờ. Desloratadin và các chất chuyển hóa được thải trừ qua nước tiểu và phân.

Chỉ định

Giảm các triệu chứng viêm mũi dị ứng gồm hắt hơi, sổ mũi và ngứa mũi, sung huyết/nghẹt mũi, cũng như ngứa, chảy nước mắt và đỏ mắt, ngứa họng và ho.

Giảm các triệu chứng liên quan đến mày đay như ngứa, giảm kích cỡ và số lượng ban.

Liều dùng và cách dùng: Uống cùng hoặc không cùng bữa ăn.

Người lớn và trẻ trên 12 tuổi: uống duy nhất 1 viên/ngày

Trẻ em từ 6-12 tuổi: ½ viên/ngày.

Trẻ dưới 6 tuổi: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định

Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Trẻ em dưới 2 tuổi: độ an toàn và hiệu quả điều trị chưa được xác định.

Tác dụng không mong muốn

Ít gặp: mệt mỏi, đau đầu, khô miệng.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

Không nên sử dụng desloratadin cho phụ nữ mang thai trừ khi có chỉ định rõ ràng.

Desloratadin được tiết vào sữa mẹ. Không nên dùng desloratadin cho phụ nữ đang cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: dùng được.

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo

Sử dụng quá liều

Khi có quá liều, cần nhắc dùng các biện pháp chuẩn để loại bỏ phần hoạt chất chưa được hấp thu. Nên điều trị triệu chứng và điều trị nâng đỡ.

Trên một nghiên cứu lâm sàng đa liều ở người lớn và thanh thiếu niên sử dụng desloratadin lên đến 45mg (cao gấp 9 lần liều lâm sàng) đã không quan sát thấy biểu hiện lâm sàng của quá liều.

Desloratadin không được bài tiết qua thẩm phân máu.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
- TC áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,
Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 03 tháng 04 năm 2012

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thư