

 VACOCIPDEX 0,3% Collyria			
® <i>Thuốc bán theo đơn</i>  Thuốc nhỏ mắt 5 ml  VACOCIPDEX 0,3%	THÀNH PHẦN Ciprofloxacin.....15mg (Ciprofloxacin.HCl.. 16,67mg) Tá dược v.đ.....5ml Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC UỐNG	® <i>Prescription drug</i>  Collyria 5 ml  VACOCIPDEX 0,3%	CHỈ ĐỊNH: Điều trị các bệnh nhiễm trùng mắt: viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, viêm bờ mi. Phòng ngừa nhiễm khuẩn mắt sau khi ghép giác mạc và kết mạc, sau tổn thương gây ra do các tác nhân vật lý và hóa học, trước và sau khi mổ mắt. LIỀU DÙNG: Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Liều thông thường: nhỏ vào mắt, mỗi lần 1-2 giọt, ngày 3-4 lần hoặc hơn nếu cần. Bệnh đau mắt hột cấp và mãn tính: 2 giọt cho mỗi mắt, 2-4 lần/ngày. CÁCH DÙNG: Rửa tay sạch trước khi nhỏ mắt. Đậy kín nắp sau khi dùng. Tránh làm bẩn đầu chai thuốc. Không dùng quá 15 ngày từ khi mở nắp chai. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Mẫn cảm với Ciprofloxacin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người có tiền sử quá mẫn với kháng sinh quinolon khác. SĐK : TC áp dụng: TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD :
 VACOPHARM Pharmaceutical Joint-Stock Co. 59 Nguyễn Huệ St, Tân An City, Long An Prov. Tel: (072) 3.828.311 • Fax: (072) 3.822.244 Factory address: Km 1864, National Road 1A, Tân Khánh Ward, Tân An City, Long An Province		 Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.828.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1864, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An	
Thuốc nhỏ mắt VACOCIPDEX 0,3% 			

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất



THÀNH PHẦN
Ciprofloxacin.....15mg
(Ciprofloxacin.HCl 16,67mg)
Tá dược v.đ 5ml

CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem tờ HDSD

Rx Thuốc bán theo đơn

GMP WHO

THUỐC NHỎ MẮT

VACOCIPDEX 0,3%

5ml

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK :
TC áp dụng: TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Để xa tầm tay trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Rx Thuốc bán theo đơn THUỐC NHỎ MẮT VACOCIPDEX 0,3%

Thành phần

Ciprofloxacin 15mg

(Ciprofloxacin.HCl 16,67mg)

Tá dược v.đ 5ml

(Acid boric, Benzalkonium clorid, Ethylen dinitril tetraacetic acid disodium salt dihydrat, Polysorbat 20, nước cất)

Quy cách đóng gói

Đóng chai 5ml, hộp 1 chai kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.



Dược lực học

Ciprofloxacin là thuốc kháng sinh bán tổng hợp, có phổ kháng khuẩn rộng, thuộc nhóm quinolon, còn được gọi là các chất ức chế DNA gyrase. Do ức chế enzym DNA gyrase, nên thuốc ngăn sự sao chép của chromosom khiến cho vi khuẩn không sinh sản được nhanh chóng. Ciprofloxacin có tác dụng tốt đối với các vi khuẩn kháng lại kháng sinh thuộc các nhóm khác (aminoglycoside, cephalosporin, tetracylin, penicilin,..).

Ciprofloxacin có phổ kháng khuẩn rất rộng, bao gồm phần lớn các mầm bệnh quan trọng. Phần lớn các vi khuẩn Gram âm, kể cả *Pseudomonas* và *Enterobacter* đều nhạy cảm với thuốc. Nói chung, các vi khuẩn Gram dương kém nhạy cảm hơn. Ciprofloxacin không có tác dụng trên phần lớn các vi khuẩn kỵ khí.

Chỉ định

Điều trị các bệnh nhiễm trùng mắt: viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, viêm bờ mi.

Phòng ngừa nhiễm khuẩn mắt sau khi ghép giác mạc và kết mạc, sau tổn thương gây ra do các tác nhân vật lý và hóa học, trước và sau khi mổ mắt.

Liều dùng: Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

Liều thông thường: nhỏ vào mắt, mỗi lần 1-2 giọt, ngày 3-4 lần hoặc hơn nếu cần.

Bệnh đau mắt hột cấp và mãn tính: 2 giọt cho mỗi mắt, 2-4 lần/ngày.

Cách dùng: Rửa tay sạch trước khi nhỏ mắt. Đậy kín nắp sau khi dùng. Tránh làm bẩn đầu chai thuốc. Không dùng quá 15 ngày từ khi mở nắp chai.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với Ciprofloxacin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Người có tiền sử quá mẫn với kháng sinh quinolon khác.

Thận trọng

Phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 15 tuổi.

Tác dụng không mong muốn

Cảm giác rất bỏng hay khó chịu ở mắt, đắng miệng sau khi nhỏ thuốc, cảm giác có dị vật trong mắt.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc: Chưa có báo cáo

Phụ nữ có thai và cho con bú: chỉ dùng khi thật cần thiết.

Xử trí quá liều: Chưa có báo cáo. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30⁰C.
- TC áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 27 tháng 06 năm 2011

KT. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu