

Hộp 10 gói x 1g thuốc bột


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 8/11/2013

ellh



THUỐC BỘT
Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg



Hộp 10 gói x 1 g thuốc bột

THÀNH PHẦN
Acetylcystein 200mg
Tá dược v.đ 1 gói

CHỈ ĐỊNH
Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.


LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Hòa tan trong nửa ly nước.
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 3 lần/ngày.
Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Người có tiền sử bị hen
Trẻ em dưới 2 tuổi.



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC BỘT
Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg



Hộp 10 gói x 1 g thuốc bột


Đối với trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

T.C. áp dụng: DDVN IV
SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD






Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



Hộp 20 gói x 1g thuốc bột

 BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG Acetylcystein 200 mg Vacomuc 200 THUỐC BỘT	 M.S.D.N: 1100112319 CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM TP. TÂN AN - T. LONG AN <i>luh</i>
THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg  BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG GMP WHO Hộp 20 gói x 1 g thuốc bột	THÀNH PHẦN Acetylcystein 200mg Tá dược v.đ 1 gói CHỈ ĐỊNH Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG Hòa tan trong nửa ly nước. Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 3 lần/ngày. Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Người có tiền sử bị hen Trẻ em dưới 2 tuổi. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg  BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG GMP WHO Hộp 20 gói x 1 g thuốc bột	 M.S.D.N: 1100112319 CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM TP. TÂN AN - T. LONG AN Để xa tầm tay của trẻ em Bắt đầu nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C Độc kỵ nước dẫn sử dụng trước khi dùng TC áp dụng: ĐIỀU IV SĐK Số lô SX Ngày SX HD  M.S.D.N: 1100112319 CỘNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM TP. TÂN AN - T. LONG AN Vacopharm Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 30 gói x 1g thuốc bột

 THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg	 <i>leh</i>
THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg  GMP WHO Hộp 30 gói x 1 g thuốc bột	THÀNH PHẦN Acetylcystein 200mg Tá dược v.d 1 gói CHỈ ĐỊNH Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG Hòa tan trong nửa ly nước. Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 3 lần/ngày. Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Người có tiền sử bị hen Trẻ em dưới 2 tuổi. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg  GMP WHO Hộp 30 gói x 1 g thuốc bột	Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng TC áp dụng: DDVN IV SDK Số lô SX Ngày SX HD  Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Hộp 50 gói x 1g thuốc bột

 THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg	 <i>Handwritten signature</i>
THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg  BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG GMP WHO Hộp 50 gói x 1 g thuốc bột	THÀNH PHẦN Acetylcystein 200mg Tá dược v.d 1 gói CHỈ ĐỊNH Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG Hòa tan trong nửa ly nước. Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 3 lần/ngày. Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Người có tiền sử bị hen Trẻ em dưới 2 tuổi. MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC BỘT Vacomuc 200 Acetylcystein 200 mg  BỘT PHA DUNG DỊCH UỐNG GMP WHO Hộp 50 gói x 1 g thuốc bột	 ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO TRẺ EM Bệnh viêm mũi họng, viêm mắt, chấn thương mắt, nhiệt độ dưới 30°C Được ký hiệu trên bao bì thuốc khi dùng TC áp dụng: ĐƠN IV Số SX Ngày SX HD  Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn gói

THÀNH PHẦN
Acetylcystein 200mg
Tá dược v.d 1 gói

CHỈ ĐỊNH: Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi để tống đờm ra ngoài trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Hòa tan trong nửa ly nước. Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi uống 1 gói/ lần, 3 lần/ ngày. Trẻ em 2 đến 7 tuổi uống 1 gói/ lần, 2 lần/ ngày.

CÁCH CHỈ ĐỊNH: Tiền sử phản cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Người có tiền sử bị hen
Trẻ em dưới 2 tuổi.

TC sử dụng: ĐBVN IV
SDK
Số lô SX
Ngày SX
HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
TP. TÂN AN - T. LONG AN

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

THUỐC BỘT
Vacomuc 200
Acetylcystein 200 mg

BỘT PHA
DUNG DỊCH UỐNG

Gói 1g

WHO GMP



Thuốc bột VACOMUC 200

Thành phần

Acetylcystein 200mg
Tá dược v.đ gói 1 gam
(Lactose, Bột hương vị cam, Sunset yellow, Aspartam, Aecsulfam kali)

Quy cách đóng gói: kèm theo toa hướng dẫn sử dụng thuốc

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Mỗi gói 1g, hộp 10 gói
2	Mỗi gói 1g, hộp 20 gói
3	Mỗi gói 1g, hộp 30 gói
4	Mỗi gói 1g, hộp 50 gói

Dược lực học

Acetylcystein là dẫn chất N-acetyl của L-cystein, một amino - acid tự nhiên. Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy và thuốc giải độc khi quá liều paracetamol. Thuốc làm giảm độ quánh của đờm ở phổi có mũ hoặc không bằng cách tách đôi cầu nối disulfua trong mucoprotein và tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài bằng ho, dẫn lưu tư thế hoặc bằng phương pháp cơ học. Acetylcystein dùng để bảo vệ chống gây độc cho gan do quá liều paracetamol, bằng cách duy trì hoặc khôi phục nồng độ glutathion của gan là chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hóa trung gian của paracetamol gây độc cho gan.

Dược động học

Sau khi uống Acetylcystein được hấp thu nhanh ở đường tiêu hóa và bị gan khử acetyl thành cystein và sau đó được chuyển hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được từ 0,5 đến 1 giờ sau khi uống. Mô phổi và các dịch tiết phế quản có ái lực đặc biệt đối với acetylcystein, nồng độ có hiệu lực của thuốc đạt được khoảng 3 giờ sau khi uống thuốc. Acetylcystein và các chất chuyển hóa chủ yếu được bài tiết qua thận.

Chỉ định

Vacomuc 200 được sử dụng để làm giảm độ quánh của đờm, tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài trong các trường hợp viêm họng, viêm phế quản cấp và mãn.

Liều lượng và cách dùng: Hòa tan trong nửa ly nước.

Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em 2 đến 7 tuổi: uống 1 gói/lần, 2 lần/ngày

Chống chỉ định

Tiền sử mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

Người có tiền sử bị hen

Trẻ em dưới 2 tuổi.

Thận trọng:

Có thể xuất hiện nhiều đàm loãng ở phế quản, cần hút để lấy ra nếu người bệnh giảm khả năng ho.

Phụ nữ có thai và cho con bú: thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Người lái xe và vận hành máy móc: thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng không mong muốn: buồn nôn, nôn. Ít gặp: buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, viêm miệng, chảy nước mũi nhiều, phát ban, mề đay.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc: Không phối hợp Acetylcystein với thuốc ức chế ho hay thuốc làm giảm tiết dịch.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng tương tự như triệu chứng của sốc phản vệ, nhưng nặng hơn nhiều, đặc biệt là giảm huyết áp. Các triệu chứng khác bao gồm suy hô hấp, tan máu, đông máu rải rác nội mạch và suy thận. Tử vong đã xảy ra ở người bệnh bị quá liều acetylcystein trong khi đang điều trị nhiễm độc paracetamol. Điều trị quá liều theo triệu chứng.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

TC áp dụng: DDVN 4.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 25 tháng 5 năm 2013

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thư

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh