

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 23/...3.../2016.

Vaco Omez
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt
bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison

Thuốc bán
theo đơn

10 vỉ x 10 viên nang cứng chứa hạt
bao tan trong ruột



THÀNH PHẦN
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong
ruột, 8,5%)
Tá dược v.d 1 viên nang cứng chứa
hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH
Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên
thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực
quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần
trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi
ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì
chia làm 2 lần.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**GMP
WHO**

Vaco Omez
Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets, 8,5%)

SUPPRESS GASTRIC ACID SECRETION & ANTULCERATE

- Gastric ulcer - duodenal ulcer
- Oesophagitis reflux
- Zollinger - Ellison syndrome

Prescription
drug

10 blisters x 10 capsules
contain enteric coated pellets

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 °C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Vacopharm
Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
10 Nguyễn Huệ, Phường 1, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08 3929 3409 - FAX: 08 3929 3402
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần
Dược VACOPHARM
Khu 1964, Quận 11, Phường Tân Hưng, Thành phố
Tân An, Tỉnh Long An - www.vacopharm.com



Vaco Omez
Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets, 8,5%)

Vacopharm

Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt
bao tan trong ruột, 8,5%)

Vaco Omez

R Thuốc bán
theo đơn

20 vỉ x 10 viên nang cứng chứa hạt
bao tan trong ruột

Vaco Omez®

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt
bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison



THÀNH PHẦN

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong
ruột, 8,5%)
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng chứa
hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH

Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú.



LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên
thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực
quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần
trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi
ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì
chia làm 2 lần.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

ch

Prescription
drug

20 blisters x 10 capsules
contain enteric coated pellets

Vaco Omez®

Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets, 8,5%)

SUPPRESS GASTRIC ACID SECRETION & ANTI-ULCERATE

- Gastric ulcer - duodenal ulcer
- Oesophagitis reflux
- Zollinger - Ellison syndrome

Vaco Omez

Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets, 8,5%)

Vacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Vacopharm
Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
(Hàng Việt Nam Thương Hiệu)
Số 2072/2.624.311 Fax (072) 3.832.341
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần
Dược VACOPHARM
Khu công nghiệp - quốc tế Tân An, phường Tân Hưng, Thành phố
Tân An, tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



slh

Omez
Omeprazol 20 mg
(as Omeprazol S.p.A.)


Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 10 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
 ĐT: 082 2 829 111 Fax: 082 2 822 044
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 10/9/94 quốc lộ 1A, phường Tân Kiên, Huyện Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 100 vỉ x 10 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt
bao tan trong ruột, 8,5%)

Vaco Omez

R_x Thuốc bán
theo đơn

100 vỉ x 10 viên nang cứng chứa hạt
bao tan trong ruột

Vaco Omez[®]

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt
bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison



THÀNH PHẦN

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong
ruột, 8,5%)

Tá dược v.d 1 viên nang cứng chứa
hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH

Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc.
Phụ nữ có thai và cho con bú.

GMP WHO

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên
thuốc.

Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần

Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần

Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực
quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần
trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.

Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi
ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì
chia làm 2 lần.

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Handwritten signature

Prescription
drug

100 blisters x 10 capsules
contain enteric coated pellets

Vaco Omez[®]

Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets, 8,5%)

SUPPRESS GASTRIC ACID SECRETION & ANTULGERATE

- Gastric ulcer - duodenal ulcer
- Oesophagitis reflux
- Zollinger - Ellison syndrome

Vaco Omez

Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets, 8,5%)

VACO PHARM

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30 C.

Vacopharm

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

STP (P) 2014/0004/AT - TP. Tân An - Tỉnh Long An
ĐT: 0272 3.809.411 - Fax: 0272 3.802.942

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần
Dược VACOPHARM

Kinh doanh: quốc vụ tây, phường Tây Nam, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An. www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Onmez
Omeprazole 20 mg
(au Omeprazole pellets, 8,5%)

Avacopharm

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 **Omez**
Omeprazole 20mg
(as Omeprazole pellets, 8.5%)

 **Avacopharm**

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Omeprazol 20mg
(as Omeprazol pellets: 8, 5%)

Atracopharm

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Omeprazole (as Omeprazole pellets, 0.5%) 20mg
Avecopharm



Số lô SX:

HD:

Ước lượng

Nhãn vỉ 20 viên

Số SX:

R_x Thuốc bán theo đơn

HĐ:

R_x Thuốc bán theo đơn

R_x Thuốc bán theo đơn

R_x Thuốc bán theo đơn

R_x Thuốc bán theo đơn

R_x Thuốc bán theo đơn

R_x Thuốc bán theo đơn

R_x Thuốc bán theo đơn

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

THÀNH PHẦN
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)
Tá được v.đ 1 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì chia làm 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

100 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Vaco Omez[®]

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison

Avacopharm

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Nhãn chai 200 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

THÀNH PHẦN
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)
Tá được v.đ 1 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì chia làm 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

200 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Vaco Omez[®]

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison

Avacopharm

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Nhãn chai 250 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

THÀNH PHẦN
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)
Tá được v.đ 1 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì chia làm 2 lần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.

GMP WHO

R_x Thuốc bán theo đơn

250 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Vaco Omez[®]

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison

Avacopharm

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SDK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

THÀNH PHẦN
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)
Tá được v.d 1 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì chia làm 2 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN 

R_x Thuốc bán theo đơn

500 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Vaco Omez[®]
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison





Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Đề xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Nhãn chai 1000 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

THÀNH PHẦN
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)
Tá được v.d 1 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

CHỈ ĐỊNH: Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên thuốc.
Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần
Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần
Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.
Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì chia làm 2 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN 

R_x Thuốc bán theo đơn

1000 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

Vaco Omez[®]
Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)

NGĂN TIẾT DỊCH ACID DẠ DÀY & CHỐNG LOÉT

- Loét dạ dày - tá tràng
- Trào ngược dịch dạ dày - thực quản
- Hội chứng Zollinger - Ellison





Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX:
Ngày SX:
HD :

Đề xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

Handwritten signature

Rx Thuốc bán theo đơn

VACOOMEZ

Thành phần

Omeprazol 20mg
(dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột, 8,5%)

Tá dược v.đ 1 viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột

(Disodium hydrogen orthophosphate, Sodium Lauryl sulphate, Calcium carbonate, Sucrose, Mannitol, Sugar, Starch powder, Polyvinyl povidone K-30, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Hydroxypropyl methyl cellulose, Methacrylic acid copolymer (L-30D), Diethyl phthalate, Talcum, Titanium dioxide, Sodium hydroxide, Tween 80)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ
9	Đóng chai 100 viên
10	Đóng chai 200 viên
11	Đóng chai 250 viên
12	Đóng chai 500 viên
13	Đóng chai 1000 viên

Được lực học

Omeprazol ức chế sự bài tiết acid của dạ dày, do ức chế có hồi phục hệ enzym hydro-kali adenosin triphosphatase (còn gọi là bơm proton) ở tế bào viền của dạ dày. Tác dụng nhanh, kéo dài nhưng hồi phục được.

Omeprazol không tác dụng lên thụ thể acetylcholin hay thụ thể histamin.

Được động học

Đạt tác dụng tối đa sau khi uống thuốc 4 ngày.

Omeprazol được hấp thu hoàn toàn ở ruột non sau khi uống từ 3 đến 6 giờ. Khả dụng sinh học khoảng 60%. Thức ăn không ảnh hưởng lên sự hấp thu thuốc ở ruột. Sự hấp thu Omeprazol phụ thuộc vào liều uống.

Thuốc gắn nhiều vào protein huyết tương (khoảng 95%) và được phân bố ở các mô, đặc biệt là ở tế bào viền của dạ dày.

Omeprazol được chuyển hóa hoàn toàn tại gan, đào thải nhanh chóng, chủ yếu qua nước tiểu (80%), phần còn lại qua phân.

Chỉ định

Loét dạ dày, loét tá tràng.
Trào ngược dịch dạ dày-thực quản.
Hội chứng Zollinger-Ellison.

Liều dùng và cách dùng

Uống vào buổi sáng và uống toàn bộ viên thuốc.

Loét dạ dày: 20-40mg/ngày trong 4 tuần

Loét tá tràng: 20-40mg/ngày trong 8 tuần

Viêm thực quản do trào ngược dạ dày-thực quản: uống 20-40mg, mỗi ngày một lần trong 4-8 tuần, sau đó duy trì 20mg/ngày.

Hội chứng Zollinger-Ellison: 20-120mg mỗi ngày, nếu dùng liều cao hơn 80mg/ngày thì chia làm 2 lần.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai và cho con bú.



llh

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc có thể gây buồn ngủ, sử dụng thận trọng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Thường gặp: nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng. **Ít gặp:** mất ngủ, rối loạn cảm giác, chóng mặt, mệt mỏi, nổi mề đay, ngứa, nổi ban, tăng tạm thời transaminase. **Hiếm gặp:** đồ mờ hồi, phù ngoại biên, phù mạch, sốt, phản vệ, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, giảm toàn bộ các tế bào máu, ngoại biên, mất bạch cầu hạt, lú lẫn có hồi phục, kích động, trầm cảm, ảo giác ở người bệnh cao tuổi và đặc biệt ở người bệnh nặng, rối loạn thính giác, vú to ở đàn ông, viêm dạ dày, nhiễm nấm *Candida*, khô miệng, viêm gan vàng da hoặc không vàng da, bệnh não ở người suy gan, co thắt phế quản, đau khớp, đau cơ, viêm thận kẽ.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Omeprazol làm tăng nồng độ Diazepam, Warfarin, Phenytoin, Ciclosporin trong máu.

Omeprazol làm tăng tác dụng của kháng sinh diệt trừ *Helicobacter pylori*, tăng tác dụng chống đông máu của Dicoumarol.

Omeprazol làm giảm chuyển hóa Nifedipin ít nhất 20% và có thể làm tăng tác dụng của Nifedipin.

Clarithromycin ức chế chuyển hóa Omeprazol làm nồng độ Omeprazol tăng gấp đôi.

Quá liều và xử trí

Quá liều xảy ra khi uống một lần tới 160mg, liều tiêm tĩnh mạch một lần tới 80mg, liều tiêm tĩnh mạch một ngày tới 200mg và liều 520mg tiêm tĩnh mạch trong thời gian 3 ngày vẫn được dung nạp tốt.

Khi uống quá liều, chỉ điều trị triệu chứng, không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 20 tháng 06 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thu

TUQ.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Lỗ Minh Hùng