

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 18/01/2013

lch



VACO SULFA-B

10 ml

THÀNH PHẦN
Natri Sulfacetamid 1g
Xanh methylen 0,2mg
Tá dược v.d 10ml
CHỈ ĐỊNH
Điều trị và phòng viêm kết mạc, loét giác mạc và các nhiễm khuẩn nông ở mắt (viêm bờ mi) do những vi khuẩn nhạy cảm; đau mắt hột và các nhiễm khuẩn *Chlamydia* khác.
Phòng nhiễm khuẩn sau khi lấy dị vật hoặc khi có tổn thương ở mắt.

Thuốc bán theo đơn



Thuốc nhỏ mắt



10 ml

LIỀU DÙNG

Nhỏ vào túi kết mạc dưới, mỗi lần 1-2 giọt, cách 2-3 giờ 1 lần.

CÁCH DÙNG: Rửa tay sạch trước khi nhỏ mắt. Đậy kín nắp sau khi dùng. Tránh làm bẩn đầu chai thuốc. Không dùng quá 15 ngày từ khi mở nắp chai.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Mẫn cảm với natri sulfacetamid hoặc một thành phần nào đó có trong thuốc.
Trẻ em dưới 2 tháng tuổi.

Thuốc bán theo đơn



Thuốc nhỏ mắt



10 ml

Tuân theo sự chỉ dẫn của
Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng

vaco SULFA-B
Natri Sulfacetamid 10%

Để xa tầm tay của trẻ em.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

vaco SULFA-B
Natri Sulfacetamid 10%

Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An



Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244



SĐK :
TC áp dụng : TCCS
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :





llh

THÀNH PHẦN Natri Sulfacetamid 1g Xanh methylen 0,2mg Tà dược y.d 10ml LIỀU DÙNG: Nhỏ vào túi kết mạc dưới, mỗi lần 1-2 giọt, cách 2-3 giờ 1 lần. CÁCH DÙNG: xem tờ HDSD Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng KHÔNG ĐƯỢC UỐNG Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244	R_x Thuốc bán theo đơn GMP WHO Thuốc nhỏ mắt vacosULFA-B 10 ml Natri Sulfacetamid 10% Vacopharm	CHỈ ĐỊNH Điều trị và phòng viêm kết mạc, loét giác mạc và các nhiễm khuẩn nông ở mắt (viêm bờ mi) do những vi khuẩn nhạy cảm; đau mắt hột và các nhiễm khuẩn <i>Chlamydia</i> khác. Phòng nhiễm khuẩn sau khi lấy dị vật hoặc khi có tổn thương ở mắt. SĐK : TC áp dụng : TCCS Số lô SX : Ngày SX : HD Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
--	--	---

Rx Thuốc bán theo đơn THUỐC NHỎ MẮT VACOSULFA-B

Thành phần

Natri sulfacetamid	1g
Xanh methylen	0,2mg
Tá dược v.đ	10ml
(Phenylmercurie nitrat, Natri tetraborat, nước cất)	

Quy cách đóng gói

Đóng chai 10ml, hộp 1 chai kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Dược lực học

Natri sulfacetamid là một dẫn chất sulfonamid dễ tan trong nước, cho dung dịch trung tính nên ít kích ứng kết mạc hơn các sulfonamid khác.

Natri sulfacetamid thường có tác dụng kìm khuẩn, nhưng ở nồng độ rất cao có thể có tác dụng diệt khuẩn. Sulfonamid cản trở vi khuẩn sử dụng acid para-aminobenzoic (PABA) hoặc acid para-aminobenzoic glutamic trong quá trình sinh tổng hợp acid folic, cần thiết cho sự phát triển của vi khuẩn nhạy cảm. Chỉ những vi khuẩn tự tổng hợp acid folic mới bị ức chế bởi sulfonamid; những vi khuẩn có khả năng sử dụng tiền chất của acid folic hoặc acid folic có sẵn không bị tác động bởi các sulfamid.

Tác dụng chống vi khuẩn của sulfonamid bị giảm khi có máu hoặc mủ vì chúng có chứa acid para-aminobenzoic.

In vitro, sulfonamid có phổ tác dụng kháng khuẩn rộng chống vi khuẩn Gram dương (*Streptococcus*, *Pneumococcus*) và vi khuẩn Gram âm (*Meningococcus*, *Gonococcus*, *E.Coli*, *Shigella*)... và một số vi khuẩn khác bao gồm *Chlamydia trachomatis*.

Dược động học

Natri sulfacetamid được hấp thu không đáng kể qua niêm mạc.

Chỉ định

Điều trị và phòng viêm kết mạc, loét giác mạc và các nhiễm khuẩn nông ở mắt (viêm bờ mi) do những vi khuẩn nhạy cảm; đau mắt hột và các nhiễm khuẩn *Chlamydia* khác.

Phòng nhiễm khuẩn sau khi lấy dị vật hoặc khi có tổn thương ở mắt.

Liều dùng

Nhỏ vào túi kết mạc dưới, mỗi lần 1-2 giọt, cách 2-3 giờ 1 lần.

Cách dùng

Rửa tay sạch trước khi nhỏ mắt. Đậy kín nắp sau khi dùng. Tránh làm bẩn đầu chai thuốc. Không dùng quá 15 ngày từ khi mở nắp chai.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với Natri sulfacetamid hoặc một thành phần nào đó có trong thuốc.

Trẻ em dưới 2 tháng tuổi.

Thận trọng

Thận trọng với những chế phẩm có chứa sulfid vì nó có thể gây phản ứng quá mẫn. Mẫn cảm chéo có thể xảy ra khi trước đó có dùng sulfonamid bằng các đường khác. Có thể làm các vi khuẩn không nhạy cảm kể cả nấm, phát triển quá mức.

Phụ nữ có thai và cho con bú: dùng được

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được

Tác dụng không mong muốn

Khi dùng sulfacetamid tại chỗ trên mắt, có thể gây nóng rát hoặc xót nhưng ít khi nặng đến nỗi phải ngừng thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Không nên dùng đồng thời với gentamicin sulfat, vì có sự đối kháng in vitro.

Không dùng đồng thời với các dẫn xuất của acid para-amino benzoic.

Natri sulfacetamid tương kỵ với chế phẩm có chứa bạc. Có thể tạo tủa với kẽm sulfat, tùy thuộc vào nồng độ của thuốc

Xử trí quá liều

Chưa có báo cáo. Nếu xảy ra trường hợp quá liều, cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 30°C.
- TC áp dụng: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072)3 826111 - 3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2012

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



KS. Phan Thị Minh Thu

