

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

10 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.828.371 - (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Kiên, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015

llh



Paracetamol 500mg
Viên nang cứng
Trẻ được v.d 1 viên nang cứng
CHỈ ĐỊNH

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1 - 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO



PARACETAMOL 500mg

Vadol caps

10 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng

20 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công Ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (027) 3.822.244 Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân An, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Paracetamol 500mg
1 vỉ Quốc v.d 1 viên nang cứng

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



PARACETAMOL 500mg

Vadol caps

20 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 50 vỉ x 10 viên nang cứng

50 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN 4

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.822.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Ấp 195, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Paracetamol 500mg
Tà dược v.d 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ
và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đúng uống. Các lần dùng thuốc cách
nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat
dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

PARACETAMOL 500mg

Vadol caps



50 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 100 vỉ x 10 viên nang cứng

100 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN 4

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

112319
CÔNG TY
CƠ PHÂN DƯỠNG
VACOPHARM
H9 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.828.311 Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ văn phòng: km 1454, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Paracetamol 500mg
Mã được v.d 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ
và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng uống uống. Các lần dùng thuốc cách
nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1 - 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat
dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

PARACETAMOL 500mg

Vadol caps



100 vỉ x 10 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 5 vỉ x 15 viên nang cứng

5 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1, Quốc lộ 1A,
phường Tân Kiên, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Handwritten signature: *llh*

Paracetamol 500mg
Tà dược yd 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ
và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách
nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.
Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat
dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



5 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT




Hộp 10 vỉ x 15 viên nang cứng

10 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN 4

SDK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1994, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

500mg
1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ
và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách
nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1 - 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat
dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



PARACETAMOL 500mg

Vadol caps

10 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 20 vỉ x 15 viên nang cứng

20 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐCVN 4

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 8.829.311 Fax: (072) 8.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 10, Quốc lộ 1A,
phường Tân Nhựt, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Handwritten signature: *leu*

M.S.D.N: 1100112319

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

TÂN AN - T. LONG AN

Paracetamol 500mg
Tà được v.d 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.
Người lớn: 1 - 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

20 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 25 vỉ x 15 viên nang cứng

25 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐEVN 4

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: KM 1064, Quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ
và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách
nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1 - 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt hụt glucose - 6 - phosphat
dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

25 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Hộp 50 vỉ x 15 viên nang cứng

50 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DBVN 4

SĐK :

Số lô SX :

Ngày SX :

HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, TP. Cần Thơ, Tỉnh Long An

ĐT: (072) 3.828.311 • Fax: (072) 3.822.244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, Quốc lộ 7A,

phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

www.vacopharm.com

Paracetamol 500mg
1 viên nang cứng

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Dùng đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng uống uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.
Người lớn: 1 - 2 viên/lần, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



PARACETAMOL 500mg

Vadol caps

50 vỉ x 15 viên nang cứng

Vadol caps

PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên



Nhãn vỉ 15 viên



Nhãn chai 100 viên nang cứng

THÀNH PHẦN
Paracetamol 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH
Giảm thân nhiệt ở người đang sốt.
Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG
Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.
Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần.
Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.
Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

100 viên nang cứng

Vadol caps
PARACETAMOL 500mg

GIẢM ĐAU - HẠ SỐT

Để xa tầm tay của trẻ em
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.911 • Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 150, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 200 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Paracetamol 500mg Tá dược v.d 1viên nang cứng CHỈ ĐỊNH Giảm thân nhiệt ở người đang sốt. Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày. Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Paracetamol. Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase. Tiêu chuẩn áp dụng: ĐENV 4 SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD :	200 viên nang cứng Vadol caps PARACETAMOL 500mg GIẢM ĐAU - HẠ SỐT GMP WHO	Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
--	---	---

Nhãn chai 250 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Paracetamol 500mg Tá dược v.d 1viên nang cứng CHỈ ĐỊNH Giảm thân nhiệt ở người đang sốt. Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày. Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Paracetamol. Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase. Tiêu chuẩn áp dụng: ĐENV 4 SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD :	250 viên nang cứng Vadol caps PARACETAMOL 500mg GIẢM ĐAU - HẠ SỐT GMP WHO	Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
--	---	---

Nhãn chai 500 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Paracetamol 500mg Tá dược v.d 1viên nang cứng CHỈ ĐỊNH Giảm thân nhiệt ở người đang sốt. Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày. Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Paracetamol. Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase. Tiêu chuẩn áp dụng: ĐENV 4 SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD :	500 viên nang cứng Vadol caps PARACETAMOL 500mg GIẢM ĐAU - HẠ SỐT GMP WHO	Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
--	---	---

Nhãn chai 1000 viên nang cứng

THÀNH PHẦN Paracetamol 500mg Tá dược v.d 1viên nang cứng CHỈ ĐỊNH Giảm thân nhiệt ở người đang sốt. Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG Dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày. Người lớn: 1-2 viên/lần, ngày 2-3 lần. Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh quá mẫn với Paracetamol. Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase. Tiêu chuẩn áp dụng: ĐENV 4 SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD :	1000 viên nang cứng Vadol caps PARACETAMOL 500mg GIẢM ĐAU - HẠ SỐT GMP WHO	Để xa tầm tay của trẻ em Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
--	--	---



VADOL CAPS

Thành phần

Paracetamol

500mg

Tá dược v.đ

1 viên nang cứng

Polyvinyl pyrrolidon K30, Acid stearic, Natri lauryl sulfat)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 05 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 10 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 20 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 25 vỉ
9	Ép vỉ, vỉ 15 viên, hộp 50 vỉ
10	Đóng chai 100 viên
11	Đóng chai 200 viên
12	Đóng chai 250 viên
13	Đóng chai 500 viên
14	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p-aminophenol) là chất chuyển hóa có hoạt tính của phenacetin, là thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu có thể thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin, Paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm. Với liều ngang nhau tính theo gam, Paracetamol có tác dụng giảm đau và hạ sốt tương tự như aspirin.

Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt ở người bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu lượng máu ngoại biên.

Paracetamol với liều điều trị ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp, không làm thay đổi cân bằng acid - base, không gây kích ứng, xước hoặc chảy máu dạ dày, vì Paracetamol không tác động trên cyclooxygenase toàn thân, chỉ tác động đến cyclooxygenase/ prostaglandin của hệ thần kinh trung ương. Paracetamol không có tác dụng trên tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu.

Khi dùng quá liều Paracetamol một chất chuyển hóa là N - acetyl - benzoquinoneimin gây độc nặng cho gan.

Dược động học

Paracetamol hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thức ăn giàu carbon hydrat làm giảm tỷ lệ hấp thu của Paracetamol. Nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được trong vòng 30 đến 60 phút sau khi uống.

Phân bố: Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô trong cơ thể. Khoảng 25% Paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương.

Thải trừ: Nửa đời huyết tương của Paracetamol là 1,25 - 3 giờ, có thể kéo dài với liều gây độc hoặc ở người bệnh có thương tổn gan.

Sau liều điều trị có thể tìm thấy 90 đến 100% thuốc trong nước tiểu trong ngày thứ nhất, chủ yếu sau khi liên hợp trong gan với acid glucuronic (khoảng 60%), acid sulfuric (khoảng 35%) hoặc cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chất chuyển hoá dạng hydroxyl-hoá và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.

Paracetamol bị N-hydroxyl hoá bởi Cytochrom P₄₅₀ để tạo nên N-acetyl-benzoquinoneimin, một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyển hoá này bình thường phản ứng với các nhóm sulfhydryl trong glutathion và như vậy bị khử hoạt tính. Tuy nhiên nếu uống liều cao Paracetamol, chất chuyển hoá này được tạo thành với lượng đủ để làm cạn kiệt glutathion của gan, trong tình trạng đó, phản ứng của nó với nhóm sulfhydryl của protein tăng lên, có thể dẫn đến hoại tử gan.

Chỉ định

Giảm thân nhiệt ở người đang sốt

Giảm đau tạm thời trong điều trị chứng đau nhẹ và vừa.



Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống. Các lần dùng thuốc cách nhau ít nhất 4-6 giờ, không quá 4g/ngày.

Người lớn: 1 –2 viên/lần, ngày 2-3 lần.

Trẻ em: tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Chống chỉ định

Người bệnh quá mẫn với Paracetamol.

Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc

Phải dùng thận trọng ở người suy gan, suy thận và nghiện rượu.

Paracetamol tương đối không độc với liều điều trị. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát sần ngứa và mề đay; những phản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch, và những phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảy ra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra với việc sử dụng những dẫn xuất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol. Hiếm gặp mất bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol.

Người bị phenylketon – niệu (nghĩa là, thiếu hụt gen xác định tình trạng của phenylalanin hydroxylase) và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào cơ thể phải được cảnh báo là một số chế phẩm paracetamol chứa aspartam, sẽ chuyển hóa trong dạ dày – ruột thành phenylalanin sau khi uống.

Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol; nên tránh hoặc hạn chế uống rượu.

Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Phụ nữ có thai: chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén liên quan đến tác dụng không mong muốn có thể có đối với phát triển thai. Do đó, chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai khi thật cần.

Phụ nữ cho con bú: nghiên cứu ở người mẹ cho con bú, dùng paracetamol không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ.

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mề đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn niêm mạc. Người bệnh mẫn cảm với salicylat hiếm mẫn cảm với Paracetamol và những thuốc có liên quan. Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, Paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu.

Ít gặp: ban, buồn nôn, loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch cầu), thiếu máu, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày.

Hiếm gặp: phản ứng quá mẫn.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Tăng độc tính gan khi dùng thuốc mà uống rượu.

Uống dài ngày với liều cao, Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và dẫn chất indandion.

Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.

Các thuốc dùng đồng thời với Paracetamol sẽ tăng nguy cơ gây độc tính cho gan: phenytoin, barbiturat, carbamazepin, isoniazid.

Probenecid có thể làm giảm đào thải paracetamol và làm tăng thời gian nửa đời trong huyết tương của paracetamol.

Isoniazid và các thuốc chống lao làm tăng độc tính của paracetamol đối với gan.

12319
NG TY
AN DUC
OPHAN
AN - T.

Quá liều và xử trí

* Biểu hiện

Hoại tử gan phụ thuộc vào liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có thể gây tử vong.

Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2-3 giờ sau khi uống liều độc của thuốc (7,5-10g mỗi ngày, trong 1-2 ngày). Methemoglobin-máu, dẫn đến chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay là một dấu hiệu đặc trưng nhiễm độc cấp tính dẫn chất p-aminophenol.

Khi ngộ độc nặng: kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động, mê sảng. Tiếp theo là ức chế hệ thần kinh trung ương, sững sờ, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nông, mạch nhanh, yếu, không đều, huyết áp thấp, suy tuần hoàn.

Dấu hiệu lâm sàng tổn thương gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều độc. Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người bệnh.

* Điều trị

Chẩn đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều Paracetamol. Khi nhiễm độc nặng, điều quan trọng là phải điều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khi uống.

Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất sulfhydryl, có lẽ tác động một phần do bổ sung dự trữ glutathion ở gan. N-acetylcystein có tác dụng khi uống hoặc tiêm tĩnh mạch. Nếu không có N-acetylcystein, có thể dùng methionin. Nếu đã dùng than hoạt trước khi dùng methionin thì phải hút than hoạt ra khỏi dạ dày trước. Ngoài ra, có thể dùng than hoạt hoặc thuốc tẩy muối, chúng có khả năng làm giảm hấp thụ paracetamol. Điều trị co giật bằng tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Địa chỉ sản xuất: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kiểm soát Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy

KS. Phan Thị Minh Thu

buộc