



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

Nhãn hộp Viên điệp hạ châu PYLANTIN (hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim)

Nhãn vỉ Viên điệp hạ châu PYLANTIN (vỉ 10 viên bao phim)

Số lô SX, hạn dùng được in nổi trên vỉ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 12/8/14

Viên điệp hạ châu PYLANTIN

Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim

Viên điệp hạ châu PYLANTIN




CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HỒNG BÀNG, QUẬN 6, TP.HCM. ĐT: 08.37517111
Sản xuất tại: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vinh Hiệp, Huyện Tân Uyên, Bình Dương

GMP-WHO

Viên điệp hạ châu PYLANTIN

CÔNG THỨC:
Cao đặc Diệp hạ châu đáng qui về khan (*Extractum Phyllanthi amari*).....289mg
Tá được.....vừa đủ 1 viên
(Tinh bột Ngô, bột cellulose, natri starch glycolat, bột talc, magnesi stearat, vàng quinolein lake, xanh patent V, chitofilm bột)

CHỈ ĐỊNH:
Trị viêm gan, viêm gan virus, viêm gan mãn tính, đặc biệt là viêm gan do siêu vi B. Viêm gan gây nên các triệu chứng mệt mỏi, đau nhức vùng hạ sườn phải, khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón. Tiêu độc trong các trường hợp đình rầu, mụn nhọt, lở ngứa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Trẻ em từ 9-16 tuổi: uống mỗi lần 1-2 viên, ngày 2 lần.
Người lớn: Uống mỗi lần 2-3 viên, ngày 3 lần.
Uống sau bữa ăn với nước ấm. Liệu trình là 1 tháng, tùy theo tình trạng bệnh có thể dùng liên tục 1-3 liệu trình. Nên uống kết hợp với thuốc bổ để nâng cao thể trạng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS. SĐK:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.



Số lô SX:
NSX:
HD:



CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Viên điệp hạ châu PYLANTIN **GMP-WHO**

Cao đặc Diệp hạ châu đáng qui về khan (*Extractum Phyllanthi amari*).....289mg

CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Viên điệp hạ châu PYLANTIN **GMP-WHO**

Cao đặc Diệp hạ châu đáng qui về khan (*Extractum Phyllanthi amari*).....289mg

CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Viên điệp hạ châu PYLANTIN **GMP-WHO**

Cao đặc Diệp hạ châu đáng qui về khan (*Extractum Phyllanthi amari*).....289mg

CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Viên điệp hạ châu PYLANTIN **GMP-WHO**

Cao đặc Diệp hạ châu đáng qui về khan (*Extractum Phyllanthi amari*).....289mg

CN CTY CPDP OPC TẠI BÌNH DƯƠNG
NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

W

Viên Diệp Hạ Châu PYLANTIN

CÔNG THỨC:

Cao đặc Diệp hạ châu đẳng qui về khan (*Extractum Phyllanthi amari*).....289 mg

Tá dược (Tinh bột Ngô, bột cellulose, natri starch glycolat, bột talc, magnesi stearat, vàng quinolein lake, xanh patent V, chitofilm bột) vđ 1 viên

CHỈ ĐỊNH:

Trị viêm gan, viêm gan virus, viêm gan mãn tính, đặc biệt là viêm gan do siêu vi B. Viêm gan gây nên các triệu chứng mệt mỏi, đau tức vùng hạ sườn phải, khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.

Tiêu độc trong các trường hợp đình rêu, mụn nhọt, lở ngứa.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Trẻ em từ 9 -16 tuổi: uống mỗi lần 1- 2 viên, ngày 2 lần.

Người lớn: uống mỗi lần 2 - 3 viên, ngày 3 lần.

Uống sau bữa ăn với nước ấm.

Liệu trình là 1 tháng, tùy tình trạng bệnh có thể dùng 1 – 3 liệu trình. Nên kết hợp với thuốc bổ để nâng cao thể trạng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Người bị tiêu chảy, người bị bệnh ưa chảy máu cần dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Phụ nữ đang bị rối loạn kinh nguyệt, người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng nặng. Nam giới có ý định sinh con.

Sau mỗi liệu trình cần được kiểm tra tình trạng bệnh tại các cơ sở chuyên khoa.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai. Phụ nữ cho con bú được sử dụng.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tác dụng phụ có thể gặp như buồn nôn nhẹ, chán ăn, khó chịu vùng thượng vị.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:

Viên nén bao phim. Hộp 5 vi x 10 viên; Hộp 2 vi x 10 viên.

HẠN DÙNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048

Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC

Ấp Tân Hóa - Xã Tân Vĩnh Hiệp - Huyện Tân Uyên - Bình Dương

E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hưng