

504/152

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015

NHẬN ỐNG

M.S.D.N.: 050.000.000-000-01.0.P

CÔNG TY

CƠ PHÂN

DƯỢC PHẨM

HÀ TÂY

Việt Dược Bô Thận Âm
Số Q: C.TY CPDP HÀ TÂY
Cao lỏng 10ml
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

NHÂN HỘP

Hộp 20 ống 10ml cao lỏng

Việt Dược Bô Thận Âm

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

Việt Dược Bô Thận Âm

Hộp 20 ống 10ml cao lỏng

THÀNH PHẦN:

Mỗi 10ml cao lỏng chứa:

Cao lỏng hỗn hợp được liều tương ứng với 250 mg

Thực địa (*Radix kermadecae glutinosa praeparata*) 800 mg

Hoa sen (*Nelumbo strobilacea persimilis*) 400 mg

Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 400 mg

Dân bì (*Coriaria laurifolia*) 300 mg

Bạch linh (*Polypodium*) 300 mg

Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 300 mg

Tà dược vđ 1 ống 10ml

ĐƯỢC QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN:

TCDS

Độ xa âm tay tế âm. Độc ký hương

đến sử dụng trước khi dùng.

SDS:

Số lô SX

Ngày SX

HD

CÔNG DỤNG:

Tu bổ can thận. Các vị trong bài thuốc có tác dụng: Thực địa từ âm bổ thận, đường tinh ích thủy là Quế Sơn thù dưỡng Can sáp tinh. Hoa sen bổ tỳ có tính là Thận. Trạch tả thanh tả Thận hỏa, giảm bớt nhiệt nê tẻ của Thực địa. Dân bì thanh Can hỏa, giảm bớt nhiệt ôn của Sơn thù. Bạch linh kiện Tỳ, trợ thấp giúp Hoài sơn kiện Tỳ cũng là Tả.

CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 2-4 ống (20-40ml) x 2 lần/ngày

Trẻ em 2-12 tuổi: Uống mỗi lần 1-2 ống (10-20ml) x 2 lần/ngày

Trẻ em dưới 2 tuổi: Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống.

CHÚNG CHỈ ĐỊNH và các thông tin khác:

Xin xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp

Sản xuất tại: CÔNG TY C.P. DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

15 dân phố 4, Phường Lê Khé,

Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng thuốc
VIỆT DƯỢC BỔ THẬN ÂM



- **Dạng thuốc:** Cao lỏng
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 20 ống x 10ml.
- **Thành phần:** Mỗi 10ml cao lỏng chứa:

Cao lỏng hỗn hợp dược liệu tương ứng với:	250 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	800 mg
Hoài sơn (<i>Tuber Dioscoreae persimilis</i>)	400 mg
Sơn thù (<i>Fructus Corni officinalis</i>)	400 mg
Đan bì (<i>Cortex Paeoniae suffruticosae</i>)	300 mg
Bạch linh (<i>Poria</i>)	300 mg
Trạch tả (<i>Rhizoma Alismatis</i>)	300 mg
Tá dược vừa đủ 1 ống	10 ml

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, acid citric, natri citrat, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Công năng:** Tư bổ can thận. Các vị trong bài thuốc có tác dụng:

Thục địa tư âm bổ Thận, dưỡng tinh ích tủy là **Quân**.

Sơn thù dưỡng Can sáp tinh,

Hoài sơn bổ Tỳ cố tinh là **Thần**.

Trạch tả thanh tả Thận hòa, giảm bớt tính nề trệ của Thục địa;

Đan bì thanh Can hòa, giảm bớt tính ôn của Sơn thù;

Bạch linh kiện Tỳ, trừ thấp giúp Hoài sơn kiện Tỳ cùng là **Tá**

- **Chỉ định:**

- + Trẻ em: Biếng ăn, ra mồ hôi trộm, cơ thể suy nhược, ốm yếu, gầy còm, người nóng.
- + Người lớn: Người gầy yếu, đau lưng, mỏi gối, ù tai, chóng mặt, di mộng tinh, háo khát, tiểu rất, ra mồ hôi trộm.

- **Liều dùng:**

- + **Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:** Uống mỗi lần 2-4 ống (20-40ml) x 2lần/ngày.
- + **Trẻ em 2-12 tuổi:** Uống mỗi lần 1-2 ống (10-20ml) x 2lần/ngày.
- + **Trẻ em dưới 2 tuổi:** Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống.

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với thuốc, người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy. Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** không dùng cho phụ nữ có thai.

- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Kiêng ăn các thứ sống, cay nóng khi đang dùng thuốc.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.**

* **Lưu ý:** Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường

Khi thấy thuốc bị vẩn đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỂ XA TÀM TAY TRẺ EM


*" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"*

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685 Số fax: 04.33829054

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy

