

505/12

Nhãn hộp

Việt Dược
Đại Bò

Hộp 20 ống 10ml cao lỏng

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17 / 12 / 2015

Việt Dược
Đại Bò

Hộp 20 ống 10ml cao lỏng

THÀNH PHẦN:

Mỗi 10ml cao lỏng chứa

Cao lỏng hoàn hợp các dược liệu 550 mg tương ứng với

Dạng sản phẩm *Gedongga phlooides* 750 mg

Bạch trạch *(Radix Alcyonodes macrocephala)* 500 mg

Phục linh *(Forsol)* 400 mg

Cần thiêu *(Radix Glycyrrhizae)* 400 mg

Đương quy *(Radix Angelicae sinensis)* 500 mg

Xuyên khung *(Rhizoma Ligustici wallichi)* 400 mg

Bạch thược *(Radix Paeoniae lactiflora)* 500 mg

Thực địa *(Radix Rehmanniae glutinosa praeparata)* 750 mg

Hương kỳ *(Radix Atractylis membranacea)* 750 mg

Quế vỏ *(Cortex Cinnamomi)* 500mg

Tà dược vĩ 10ml

SDK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

TIÊU CHUẨN: TCCS

Nhãn ống

Việt Dược Đại Bò

SX tại C.TY CPDP HÀ TÂY

Cao lỏng 10ml

KHÔNG ĐƯỢC TIÊM

LÀ SX:

HD:



Việt Dược
Đại Bò

CHỈ ĐỊNH:

Có tác dụng hỗ trợ sự huyết và là phương thuốc hỗ trợ cho bệnh nhân ở thời kỳ toàn thân suy nhược do các bệnh mạn tính, điều trị trong các trường hợp có thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, tiêu hóa không tốt, hoa mắt, cơ thể mệt mỏi, da ngứa, khô, lạnh chân tay, kinh nguyệt không đều, phụ nữ băng râm kinh.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

- Ngâm ấm và trẻ em trên 12 tuổi: Uống mỗi lần 2 - 3 ống (20-30ml) x 2 - 3 lần/ngày.

- Trẻ em 2 - 12 tuổi: Uống mỗi lần 1 ống (10ml) x 2 - 3 lần/ngày.

- Trẻ em dưới 2 tuổi: Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Hãy theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH và CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xin xem đơn hướng dẫn sử dụng thuốc bên trong hộp.

Đề xa tâm tạng trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

10 Đường số 4, Phường 10, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Hướng dẫn sử dụng thuốc
VIỆT DƯỢC ĐẠI BỔ



- **Dạng thuốc:** Cao lỏng
- **Qui cách đóng gói:** Hộp 20 ống x 10ml.
- **Thành phần:** Mỗi 10ml cao lỏng chứa:

Cao lỏng hỗn hợp các dược liệu tương ứng với:	550 mg
Đảng sâm (<i>Radix Codonopsis pilosulae</i>)	750 mg
Bạch truật (<i>Radix Atractylodis macrocephalae</i>)	500 mg
Phục linh (<i>Poria</i>)	400 mg
Cam thảo (<i>Radix Glycyrrhizae</i>)	400 mg
Đương quy (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	500 mg
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	400 mg
Bạch thược (<i>Radix Paeoniae lactiflorae</i>)	500 mg
Thục địa (<i>Radix Rehmanniae glutinosae praeparata</i>)	750 mg
Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	750 mg
Quế vỏ (<i>Cortex Cinnamomi</i>)	500 mg
Tá dược vừa đủ	10 ml

(Tá dược gồm: Nipagin, nipasol, acid citric, natri citrat, aspartam, ethanol 96%, nước tinh khiết).

- **Chỉ định:** Có tác dụng bồi bổ khí huyết và là phương thuốc hỗ trợ cho bệnh nhân ở thời kỳ toàn thân suy nhược do các bệnh mạn tính, điều trị trong các trường hợp cơ thể suy nhược, thiếu máu, kém ăn, hồi hộp, chóng mặt, hoa mắt, ra mồ hôi trộm, di mộng tinh, thị lực giảm, lạnh chân tay, kinh nguyệt không đều, phụ nữ băng rong kinh.

- **Cách dùng và liều dùng:**

- + *Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:* Uống mỗi lần 2-3 ống (20-30ml) x 2-3 lần/ngày.
- + *Trẻ em 2-12 tuổi:* Uống mỗi lần 1 ống (10ml) x 2-3 lần/ngày.
- + *Trẻ em dưới 2 tuổi:* Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Hay theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Có thể uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước tinh khiết để uống.

- **Chống chỉ định:**

- + Mẫn cảm với thuốc, người tỳ vị hư hàn, ỉa chảy.
- + Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- + Phụ nữ có thai.
- + Người thể nhiệt, âm hư, chứng háo khát.

- **Thận trọng:** Người tăng huyết áp.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai:** Không dùng cho phụ nữ có thai.

- **Sử dụng phụ nữ cho con bú:** Dùng thuốc khi có sự chỉ dẫn thật cụ thể của thầy thuốc.

- **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo.

* **Ghi chú:** " Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Kiêng ăn các thứ sống, cay nóng khi đang dùng thuốc.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý : Chế phẩm sử dụng chất tạo ngọt aspartam nên sử dụng được cho bệnh nhân tiểu đường. Khi thấy thuốc bị vẩn đục, chuyển mùi, số lô SX, HD mờ.... hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P.ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

Số điện thoại: 04.33824685 - Số fax: 04.33829054

CÔNG TY C.P.ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Bá Lai



**TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu Thủy