

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/
HATAY PHARMACEUTICAL J.S.C
La Khê - Hà Đông - T.P Hà Nội/
La Khe - Ha Dong - Ha Noi City

VIETSEYE

VIETSEYE



Số lô SX (Lot.No) :
Ngày SX (Mfg.Date) :
HD (Exp.Date) :

VIETSEYE



Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc

Viên nang mềm

VIETSEYE



- **Dạng thuốc:** Viên nang mềm.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 3 vỉ x 10 viên.

- **Thành phần:**

Vitamin A (Retinyl palmitat) 1000IU

Lutein 2,5mg

Tá dược vđ 1 viên.

Vitamin E (α-Tocopheryl) 100IU

Zeaxanthin 0,5mg

(Tá dược gồm: Dầu đậu nành, gelatin, glycerin, nước cất, dầu cọ, sáp ong trắng, nipagin, nipasol, sorbitol, ethyl vanilin, Phẩm màu Chlorophyll).

- **Chỉ định:**

Phòng ngừa các bệnh mạn tính của mắt như đục thủy tinh thể, bệnh thoái hoá điểm vàng tuổi già.

Bổ sung nhu cầu vitamin A, E, Lutein và Zeaxanthin cho cơ thể hàng ngày.

- **Cách dùng và liều dùng:** Uống thuốc trong các bữa ăn.

Người lớn : Uống mỗi lần 1 viên x 2 lần/ngày.

Trẻ em: Uống theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Chống chỉ định:** Người bị mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Người bệnh thừa Vitamin A.

- **Thận trọng:** Cần thận trọng khi có dùng thuốc khác có chứa Vitamin A.

- **Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:** Thuốc chỉ dùng được cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú khi thật cần thiết theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Có thể xảy ra rối loạn tiêu hoá như: nôn, phân lỏng, tiêu chảy. Đối với phụ nữ mang thai, liều Vitamin A trên 8.000IU/ngày có thể gây độc cho thai nhi. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.

***Ghi chú:** "Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ và thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác thuốc:**

* Vitamin A: Neomycin, cholestyramin, parafin lỏng làm giảm hấp thu của vitamin A qua màng ruột. Các thuốc tránh thai có thể làm tăng nồng độ vitamin A trong huyết tương và có tác dụng không thuận lợi cho sự thụ thai. Cần tránh dùng đồng thời vitamin A với Isotretinoin vì có thể dẫn đến tình trạng như dùng vitamin A quá liều.

* Vitamin E: đối kháng với tác dụng của vitamin K nên làm tăng thời gian đông máu.

- **Quá liều và xử trí:** Không nên sử dụng quá liều chỉ định.

* Vitamin E (Dùng quá 3000 UI/ngày) có thể gây rối loạn tiêu hoá: Buồn nôn, nôn, đầy hơi, đi lỏng, viêm ruột hoại tử.

* Vitamin A (Dùng 8000 UI/ngày x 10 -15 ngày liên hoặc phụ nữ có thai dùng quá 8000 UI/ngày) gây ngứa, khô tóc, chán ăn, buồn nôn.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, loang màu, dính vỏ nang, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới trả lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS.

Để xa tầm tay trẻ em

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông- TP. Hà Nội
ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY



Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐS. Nguyễn Bá Lai

