

MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm VIPONAT 60 Viên
Kích thước hộp : 115 x 80 x 65 mm
Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 12/6/2014



MẪU NHÃN HỘP

Sản phẩm : Viên nang mềm VIPONAT 30 Viên
Kích thước hộp : 115 x 80 x 42 mm
Tỷ lệ : 70%
Nội dung : như mẫu



MẪU NHÃN VỈ

Sản phẩm : Viên nang **VIPONAT**
Kích thước vỉ : 72 x 107 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung : như mẫu



Số lô SX, NSX, HD sẽ được dập nổi trên vỉ



Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ

VIPONAT

SĐK:.....

■ THÀNH PHẦN

Mỗi viên nang mềm chứa:

Hoạt chất: DL-alpha tocopherol400 IU

Tá dược: Dầu đậu nành, gelatin, glycerin đậm đặc, ethyl vanillin.

■ CHỈ ĐỊNH

- Điều trị tình trạng thiếu vitamin E, gồm các biểu hiện về bệnh cơ và thần kinh như giảm phản xạ, dáng đi bất thường, giảm nhạy cảm với rung động và cảm thụ bản thân, liệt cơ mắt, bệnh vồng mạc nhiễm sắc tố, thoái hóa sợi trục thần kinh.
- Là một vitamin tan trong chất béo, vitamin E giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa các axit béo chưa bão hòa. Vitamin E phản ứng với các gốc tự do, là nguyên nhân gây ra các phản ứng oxy hóa làm tổn thương màng tế bào, ngăn tạo ra các gốc tự do khác. Do đó, vitamin E thường được sử dụng như một chất chống oxy hóa.

■ LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG

Người lớn: liều thông thường là 1 viên/ngày hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

■ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

■ THẬN TRỌNG

Chưa có báo cáo.

■ TƯƠNG TÁC THUỐC

Vitamin E đối kháng với tác dụng của vitamin K, nên làm tăng thời gian đông máu.

Vitamin E liều cao có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông máu.

Nồng độ vitamin E thấp ở người bị kém hấp thu do thuốc (như kém hấp thu khi dùng cholestyramin).

■ DÙNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Trong thời kỳ mang thai, thiếu hoặc thừa vitamin E đều không gây biến chứng cho mẹ hoặc thai nhi. Ở người mẹ được dinh dưỡng tốt, lượng vitamin E có trong thức ăn là đủ và không cần bổ sung. Nếu chế độ ăn kém, nên bổ sung cho đủ nhu cầu hàng ngày khi có thai.

Thời kỳ cho con bú: Vitamin E vào sữa. Sữa người có lượng vitamin E gấp 5 lần sữa bò và có hiệu quả hơn trong việc duy trì đủ lượng vitamin E trong huyết thanh cho trẻ đến 1 năm tuổi. Nhu cầu vitamin E hàng ngày trong khi cho con bú là 12 mg. Chỉ cần bổ sung cho mẹ khi thực đơn không cung cấp đủ lượng vitamin E cần cho nhu cầu hàng ngày.

■ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Không ảnh hưởng

■ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Vitamin E thường được dung nạp tốt. Liều cao có thể gây tiêu chảy, đau bụng, và các rối loạn tiêu hóa khác và cũng có thể gây mệt mỏi, yếu.

* Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

■ SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về việc sử dụng thuốc quá liều.

■ BẢO QUẢN

Bảo quản trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ dưới 30°C.

■ HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng



■ **ĐÓNG GÓI:** Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm.
Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm.

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

Số 25, đường số 8, khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng