

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

* **Phòng bệnh:** Uống 1 viên/ngày.

* **Điều trị:**

Beri-beri thể nhẹ:

Người lớn: uống 3 viên, uống 1 lần hoặc chia làm 2 - 3 lần/ngày.

Trẻ em: uống 1 viên/ngày.

Beri-beri thể nặng: Uống 30 viên, chia 2 - 3 lần/ngày (nên dùng viên Vitamin B1 100mg).

Nghiện rượu mạn kèm viêm đa dây thần kinh: Uống 4 viên/ngày.

Viêm đa dây thần kinh do thiếu Vitamin B1 ở người mang thai: Uống 1/2 - 1 viên/ngày, uống hàng ngày.

Nếu nôn nhiều: Tiêm bắp.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

LỌ 1000 VIÊN NÉN

GMP - WHO

VITAMIN B₁ 10 mg

Thiamin nitrat 10 mg

Thuốc cung cấp cho bệnh viện



HATAPHAR

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:

Thiamin nitrat10 mg

Tá dược vđ1 viên

CHỈ ĐỊNH: Dự phòng và điều trị các trường hợp thiếu vitamin B1, bệnh tê phù (beri-beri), viêm đau dây thần kinh, suy nhược cơ thể.

**Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng**

TIÊU CHUẨN: ĐVN IV

SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX:

HD :

Sản xuất tại: CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội



CỤC
Đ

Ả

VITAMIN B₁ 10mg

-Dạng thuốc: Viên nén

-Qui cách đóng gói: Lọ 1000 viên

-Thành phần: Thiamin nitrat 10mg
Tá dược vđ 1viên

(Tá dược gồm: Lactose, tinh bột sắn, tinh bột mì, gelatin, magnesi stearat, bột talc, ethyl vanilin, nước tinh khiết, ethanol 96%)

- **Chỉ định:** Dự phòng và điều trị các trường hợp thiếu vitamin B₁, bệnh tê phù (beri-beri), viêm đau dây thần kinh, suy nhược cơ thể.

- **Cách dùng và liều dùng:**

* Phòng bệnh: Uống 1 viên/ngày

* Điều trị:

+ Beri-beri thể nhẹ:

Người lớn: Uống 3 viên, uống 1 lần hoặc chia làm 2-3 lần /ngày.

Trẻ em: Uống 1 viên/ngày

+ Beri-beri thể nặng: Uống 30 viên, chia làm 2-3 lần/ngày (Nên dùng viên Vitamin B₁ 100mg).

+ Nghiện rượu mạn kèm viêm da dây thần kinh: Uống 4viên/ngày.

+ Viêm da dây thần kinh do thiếu vitamin B₁ ở người mang thai:

Uống 1/2-1viên/ngày, uống hàng ngày.

Nếu nôn nhiều: Tiêm bắp.

- **Chống chỉ định:** Quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Rất hiếm xảy ra và thường theo kiểu dị ứng. Các phản ứng quá mẫn xảy ra chủ yếu khi tiêm. Tuy nhiên khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.

Ghi chú: "Nếu cần thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ và thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

- **Tương tác thuốc:** Chưa thấy báo cáo.

- **Quá liều và xử trí:** Chưa có tài liệu báo cáo.

- **Hạn dùng:** 36 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.** Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, biến màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác..... phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn

-**Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN IV.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.33522203

FAX: 04.33522203

CÔNG TY C.P ĐƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Ký Tổng giám đốc



ĐƯỢC
YẾT

