


Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 17/12/2015



THÀNH PHẦN

Acid ascorbic 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn
xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường
uống, dùng cho người lớn.

Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày,
uống ít nhất trong 2 tuần.

Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh
methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người
bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase
(G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có
tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển
hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh
thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP
WHO



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS


SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần
Dược VACOPHARM**

Km 1/854, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An • www.vacopharm.com



Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim



THÀNH PHẦN

Acid ascorbic 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn
xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường
uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày,
uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh
methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người
bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase
(G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có
tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển
hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh
thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**GMP
WHO**



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không qua 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :


Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần
Dược VACOPHARM**

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim




THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C


Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3 829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim



THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

elr



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C


Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com



Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim



THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.


LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

Handwritten signature




Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
Km 1/HS4, quốc lộ 1A, phường Tân Khanh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com



Hộp 10 vỉ x 20 viên nén bao phim



THÀNH PHẦN

Acid ascorbic 500mg
Tá được v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn
xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường
uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày,
uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh
methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người
bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase
(G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có
tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển
hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh
thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

**MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

**GMP
WHO**



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :


Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
**Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần
Dược VACOPHARM**

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



Hộp 25 vỉ x 20 viên nén bao phim



THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá được v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO

Handwritten signature



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C


Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com



Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIÊN

Hộp 50 vỉ x 20 viên nén bao phim



THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Té được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sẵn xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Handwritten signature in blue ink.



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
Số Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
Km 19S4, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An • www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vì 10 viên



Nhãn vì 20 viên



Nhãn 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sắc xanh methylen.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sắc xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

R_x Thuốc bán theo đơn

100 viên nén bao phim

Vitamin C 500mg
Acid ascorbic 500mg

VACOPHARM

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

GMP WHO

Nhãn 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sắc xanh methylen.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sắc xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

R_x Thuốc bán theo đơn

200 viên nén bao phim

Vitamin C 500mg
Acid ascorbic 500mg

VACOPHARM

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

GMP WHO

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn 300 viên nén bao phim


THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sắc xanh methylen.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sắc xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

Nhãn 500 viên nén bao phim


THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sắc xanh methylen.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sắc xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

Nhãn 1000 viên nén bao phim


THÀNH PHẦN
Acid ascorbic 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.
Methemoglobin huyết vô căn khi không có sắc xanh methylen.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: dùng đường uống, dùng cho người lớn.
Bệnh thiếu vitamin C (scurbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.
Methemoglobin - huyết khi không có sắc xanh methylen: 1 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :



Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

GMP WHO

Rx Thuốc bán theo đơn

VITAMIN C 500

Thành phần

Acid ascorbic

500mg

Tá dược v.đ

1 viên nén bao phim

(Tinh bột sắn, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Natri edetat, Pregelatinized starch, Titan dioxyd, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Sunset yellow lake, Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
2	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 20 vỉ
3	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ
4	Ép vỉ, vỉ 10 viên, hộp 100 vỉ
5	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 05 vỉ
6	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 10 vỉ
7	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 25 vỉ

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vỉ, vỉ 20 viên, hộp 50 vỉ
9	Đóng chai 100 viên
10	Đóng chai 200 viên
11	Đóng chai 300 viên
12	Đóng chai 500 viên
13	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Acid ascorbic và các muối calci ascorbat, natri ascorbat là các dạng chủ yếu của vitamin C. Cơ thể người không tạo ra được vitamin C cho bản thân, mà phải lấy từ nguồn thức ăn. Nhu cầu hàng ngày qua chế độ ăn cần khoảng 30 - 100mg vitamin C đối với người lớn. Tuy nhiên, nhu cầu này thay đổi tùy theo từng người.

Thiếu hụt vitamin C xảy ra khi thức ăn cung cấp không đầy đủ lượng vitamin C cần thiết, dẫn đến bệnh scorbut. Thiếu hụt biểu hiện ở triệu chứng dễ chảy máu (mạch máu nhỏ, chân răng, lợi), thành mao mạch dễ vỡ, thiếu máu, tổn thương sụn và xương, chậm liền vết thương.

Acid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hoá - khử. Có một số chức năng sinh học của acid ascorbic đã được xác định rõ ràng, gồm có sinh tổng hợp collagen, carnitin, catecholamin, tyrosin, corticosteroid và aldosteron. Acid ascorbic cũng đã tham gia như một chất khử trong hệ thống enzym chuyển hoá thuốc cùng với cytochrom P₄₅₀. Hoạt tính của hệ thống enzym chuyển hoá thuốc này sẽ bị giảm nếu thiếu acid ascorbic. Acid ascorbic còn điều hòa hấp thu, vận chuyển và dự trữ sắt.

Dược động học

Acid ascorbic được hấp thu dễ dàng sau khi uống, tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và có thể bị hạn chế sau những liều rất lớn.

Acid ascorbic phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein.

Acid ascorbic oxy - hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Khi cơ thể bão hoà acid ascorbic và nồng độ máu vượt quá ngưỡng, acid ascorbic không biến đổi được và đào thải vào nước tiểu

Khi bão hòa ở mô và nồng độ acid ascorbic ở máu thấp, acid ascorbic đào thải ít hoặc không đào thải vào nước tiểu. Acid ascorbic có thể loại bỏ được bằng thẩm phân máu.

Chỉ định

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.

Methemoglobin huyết vô căn khi không có sắt xanh methylen.

Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống, dùng cho người lớn.

Bệnh thiếu vitamin C (scorbut): 1 viên/ngày, uống ít nhất trong 2 tuần.

Methemoglobin - huyết khi không có sắt xanh methylen: 1 viên/ngày.



Chống chỉ định

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G₆PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Thận trọng

Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc. Uống liều lớn Vitamin C trong thời gian mang thai có thể dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C, Vitamin C có thể gây acid hóa nước tiểu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc thuốc trong đường tiết niệu.

Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase dùng liều cao vitamin C tiềm ẩn mạch hoặc uống có thể bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C.

Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm chứa vitamin C uống có thể gây nên sự ăn mòn men răng.

Có thể gây tan máu ở trẻ sơ sinh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.

Cần cân nhắc cho bệnh nhân đang phải ăn hạn chế muối khi sử dụng vitamin C ở dạng muối natri ascorbat. Mỗi gam natri ascorbat chứa khoảng 5mEq natri.

Dùng thận trọng với người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và rối loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

Phụ nữ có thai và cho con bú: Acid ascorbic đi qua được nhau thai, nồng độ máu trong dây rốn gấp 2 – 4 lần nồng độ trong máu mẹ. Nếu dùng vitamin C theo nhu cầu bình thường hàng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn vitamin C trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Acid ascorbic phân bố trong sữa mẹ. Sữa của người mẹ có chế độ ăn bình thường chứa 40 – 70 microgam vitamin C/ml, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đối với trẻ sơ sinh.

Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ.

Tác dụng không mong muốn

Tăng oxalat - niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, co cứng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra tiêu chảy.

Thường gặp: Tăng oxalat niệu.

Ít gặp: Thiếu máu tan máu, bừng đỏ, suy tim, xù, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, nôn, ợ nóng, đau bụng, co thắt cơ bụng, đầy bụng, tiêu chảy, đau cạnh sườn.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Khi phối hợp Vitamin C với sắt, tăng hấp thu sắt.

Dùng đồng thời với Aspirin làm tăng bài tiết Vitamin C và giảm bài tiết Aspirin trong nước tiểu.

Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫn đến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương.

Sự acid - hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác.

Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B₁₂; cần khuyên người bệnh tránh uống vitamin C liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin B₁₂.

Vitamin C có thể làm giảm hấp thụ selen (uống cách nhau ít nhất 4 giờ).

Vitamin C có thể làm tăng tác dụng của nhôm hydroxyd và làm giảm tác dụng của amphetamin.

Vì vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa - khử. Sự có mặt vitamin C trong nước tiểu làm tăng giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng thuốc thử đồng (II) sulfat và giảm giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương pháp glucose oxydase.

Có một vài báo cáo vitamin C làm giảm tác dụng chống đông máu của warfarin, nhưng không chắc chắn.

Quá liều và xử trí

Triệu chứng: sôi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy.

Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 20 tháng 07 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



KS. Phan Thị Minh Thư



TUQ CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy

