


MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

* Mẫu nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên

Lần đầu: 18 / 01 / 2013



Tp. HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2012

GIÁM ĐỐC



DS. NGUYỄN VĂN SƠN

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM & SINH HỌC Y TẾ
 Lô III-18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

MẪU NHÃN DĂNG KÝ

* Mẫu nhãn vỉ 10 viên



* Mẫu nhãn chai 100 viên



Tp.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2012
 GIÁM ĐỐC



DS. NGUYỄN VĂN SƠN

Thuốc bán theo đơn

VITAMIN PP 500 mg**CÔNG THỨC:**

Nicotinamid 500 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên
(Tinh bột lúa mì, Avicel M101, Bột Talc, Magnesi stearat, Màu sunset yellow lake, HPMC 606, HPMC 615, PEG, PVP, Titan dioxyd,...)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị bệnh pellagra
- Điều trị bệnh viêm miệng, viêm lợi, viêm kết tràng mạn tính, ban đỏ do thiếu vitamin PP.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:*Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.*

- * Điều trị bệnh pellagra: người lớn dùng 1 viên/ ngày. Có thể dùng tối đa 3 viên/ ngày
- * Điều trị viêm miệng, lợi, viêm kết tràng mạn tính, ban đỏ do thiếu vitamin PP: 1 viên/ ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với nicotinamid.
- Bệnh gan nặng.
- Loét dạ dày tiến triển.
- Xuất huyết động mạch.
- Hạ huyết áp nặng.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

Thận trọng khi sử dụng nicotinamid với liều cao cho bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút và bệnh đái tháo đường.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Sử dụng nicotinamid đồng thời với chất ức chế men khử HGM – CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân.
- Sử dụng nicotinamid đồng thời với thuốc chẹn alpha- adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức.
- Khẩu phần ăn và/ hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với nicotinamid.
- Sử dụng nicotinamid đồng thời với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc cho gan.
- Không nên dùng đồng thời nicotinamid với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng trên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Sử dụng nicotinamid liều cao như trong trường hợp điều trị pellagra, có thể xảy ra một số tác dụng sau đây:

- * *Thường gặp:* buồn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da.
- * *Ít gặp:* loét dạ dày tiến triển, nôn, chán ăn, đau khi đói, đầy hơi, tiêu chảy; khô da, tăng sắc tố, vàng da; suy gan, giảm dung nạp glucose, tăng tiết tuyến bã nhờn, làm bệnh gút nặng thêm; tăng glucose huyết, tăng uric huyết, cơn phết vị, huyết quản, đau đầu và nhìn mờ, hạ huyết áp, chóng mặt, tim đập nhanh, ngất.
- * *Hiếm gặp:* lo lắng, hốt hoảng, glucose niệu, chức năng gan bất bình thường, thời gian prothombin bất bình thường, hạ albumin huyết, choáng phản vệ.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:

- * *Thời kỳ mang thai:* sử dụng nicotinamid với liều bổ sung khẩu phần ăn cho người mang thai không gây tác hại cho người mẹ và bào thai.
- * *Thời kỳ cho con bú:* sử dụng nicotinamid với liều bổ sung khẩu phần ăn của người cho con bú không gây ra bất cứ tác hại nào cho người mẹ và trẻ bú sữa mẹ. Tuy nhiên chỉ nên dùng thuốc khi khẩu phần ăn không cung cấp đủ nicotinamid.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:

Khi quá liều xảy ra, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.



ĐÓNG GÓI: Vỉ 10 viên – Hộp 10 vỉ. Chai 100 viên

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.



MEBIPHAR

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Lô III- 18 đường 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2012



PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh



GIÁM ĐỐC
DS. NGUYỄN VĂN SƠN

