

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT


Lần đầu: 12/12/2013

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐBVN 4

SĐK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HĐ :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Số Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com



Viêm lở trong miệng

Nicotinamid . . . 500mg

Vitamin PP

R_x Thuốc bán theo đơn

10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng



THÀNH PHẦN
Nicotinamid 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh pellagra.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ
dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp
nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12
tuổi.

GMP WHO
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

R_x Prescription drug

10 tablets x 10 film coated tablets

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker



MST: 1100112319
CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
VACOPHARM
www.vacopharm.com

MST: 1100112319
CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
VACOPHARM
www.vacopharm.com



Viêm lở trong miệng

Nicotinamid . . . 500mg

Vitamin PP

R_x Thuốc bán theo đơn

20 vỉ x 10 viên nén bao phim

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng



THÀNH PHẦN
Nicotinamid 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh pellagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GMP WHO
VACOPHARM
vacopharm.com

R_x Prescription drug

20 Millers x 10 film coated tablets

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker




Để xa tầm tay của trẻ em
Tuần theo sự chỉ dẫn của Thấy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DDVN 4
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT (072) 3 829 311 * Fax (072) 3 822 244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com





Viêm lở trong miệng

Nicotinamid . . . 500mg

Vitamin PP

Thuốc bán theo đơn

50 vỉ x 10 viên nén bao phim

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng

Viacopharm

THÀNH PHẦN

Nicotinamid 500mg
 Tá dược v.d 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH
 Điều trị bệnh pellagra.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
 Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
 Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
 MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

50 vỉ x 10 viên nén bao phim

Vitamin PP

Thuốc bán theo đơn

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng

Viacopharm

Để xa tầm tay của trẻ em
 Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
 Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
 SDK :
 Số lô SX :
 Ngày SX :
 HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
 ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com

50 blisters x 10 film coated tablets

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker

Viacopharm



Viêm lở trong miệng

Nicotinamid . . . 500mg

Vitamin PP

R_x Thuốc bán
theo đơn

100 vỉ x 10 viên nén bao phim

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng



THÀNH PHẦN
Nicotinamid 500mg
Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh pellagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ
dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp
nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12
tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



R_x Prescription
drug

100 blisters x 10 film coated tablets

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker




Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐENVN 4

SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com



Viêm lở trong miệng

Nicotinamid . . . 500mg

Vitamin PP

Thuốc bán theo đơn

5 vỉ x 20 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN
Nicotinamid 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim
CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh pellagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ
dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp
nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12
tuổi.

Viêm lở trong miệng

Nicotinamid . . . 500mg

Thuốc bán theo đơn

5 vỉ x 20 viên nén bao phim

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Thuốc bán theo đơn

5 vỉ x 20 viên nén bao phim

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thày thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
Tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐEVN 4
SDK :
Số lô SX :
Ngày SX :
HD :

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3 825 331 Fax: (072) 3 822 244
Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường
Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com



Handwritten signature



Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Viêm lở trong miệng

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker

Vitamin PP

Nicotinamid . . . 500mg

Canker

[illegible]

THÀNH PHẦN
Nicotinamid 500mg
Tá được v.đ 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh pellagra.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Prescription
R drug

Vitamin PP

Nicotinamid ... 500mg

Canker

Avacopharm

0012379

CÔNG TY

CÔNG PHÂN DƯỢC

COPHARM

copharm.com

Để xa tầm tay của trẻ em
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SGS

SYNOPSIS

NOV 1987

262

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3 829 311 • Fax: (072) 3 822 244

Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phú Hòa

Tân Khánh. Thành phố Tân An. Tỉnh Long An.

www.vacopharm.com

 Viêm lỗ trong miệng	Nicotinamid ... 500mg Vitamin PP R_x Thuốc bán theo đơn	80 vỉ x 20 viên nền bao phim Vitamin PP Nicotinamid ... 500mg	Viêm lỗ trong miệng 
--	---	---	--

THÀNH PHẦN
Nicotinamid 500mg
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim

CHỈ ĐỊNH
Điều trị bệnh pellagra.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước
Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ
dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp
nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12
tuổi.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Prescription
R_x drug

Vitamin PP

Nicotinamid ... 500mg

Canker

Avacopharm




2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 10 viên



Nhãn vỉ 20 viên



2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 100 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN Nicotinamid 500mg Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Điều trị bệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. GMP WHO	R_x Prescription drug 100 viên nén bao phim Vitamin PP Nicotinamid ... 500mg Viêm lở trong miệng Avacopharm	Để xa tầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4 SĐK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
--	---	--

Nhãn chai 200 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN Nicotinamid 500mg Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Điều trị bệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN GMP WHO	R_x Prescription drug 200 viên nén bao phim Vitamin PP Nicotinamid ... 500mg Viêm lở trong miệng Avacopharm	Để xa tầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4 SĐK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
--	---	--

Nhãn chai 250 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN Nicotinamid 500mg Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Điều trị bệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN GMP WHO	R_x Prescription drug 250 viên nén bao phim Vitamin PP Nicotinamid ... 500mg Viêm lở trong miệng Avacopharm	Để xa tầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4 SĐK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 * Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
--	---	--

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn chai 500 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN Nicotinamid 500mg Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Điều trị bệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN	R_x Prescription drug 500 viên nén bao phim Vitamin PP Nicotinamid . . . 500mg Viêm lở trong miệng GMP WHO Vacopharm	Để xa tầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4 SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
---	--	--

Nhãn chai 1000 viên nén bao phim

THÀNH PHẦN Nicotinamid 500mg Tá dược v.đ 1 viên nén bao phim CHỈ ĐỊNH Điều trị bệnh pellagra. LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: uống với 1 cốc nước Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi. THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN	R_x Prescription drug 1000 viên nén bao phim Vitamin PP Nicotinamid . . . 500mg Viêm lở trong miệng GMP WHO Vacopharm	Để xa tầm tay của trẻ em Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn áp dụng: ĐVN 4 SDK : Số lô SX : Ngày SX : HD : Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An ĐT: (072) 3.829.311 • Fax: (072) 3.822.244 Địa chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
---	---	--

Handwritten signature

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx Thuốc bán theo đơn

VITAMIN PP

Thành phần

Nicotinamid

500mg

Tá dược v.đ

1 viên nén bao phim

(Lactose, Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Talc, Natri starch glycolat, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Titan dioxyd, Sunset yellow lake, Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1	Ép vi, vi 10 viên, hộp 10 vi
2	Ép vi, vi 10 viên, hộp 20 vi
3	Ép vi, vi 10 viên, hộp 50 vi
4	Ép vi, vi 10 viên, hộp 100 vi
5	Ép vi, vi 20 viên, hộp 05 vi
6	Ép vi, vi 20 viên, hộp 10 vi
7	Ép vi, vi 20 viên, hộp 25 vi

STT	Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
8	Ép vi, vi 20 viên, hộp 50 vi
9	Đóng chai 100 viên
10	Đóng chai 200 viên
11	Đóng chai 250 viên
12	Đóng chai 500 viên
13	Đóng chai 1000 viên

Dược lực học

Trong cơ thể, Nicotinamid thực hiện chức năng sau khi chuyển hóa thành nicotinamid adenin dinucleotid (NAD) hoặc nicotinamid adenin dinucleotid phosphat (NADP). NAD và NADP có vai trò sống còn trong chuyển hóa, như một coenzym xúc tác phản ứng oxy hóa khử cần thiết cho hô hấp tế bào, phân giải glycogen và chuyển hóa lipid. Trong các phản ứng đó các coenzym này có tác dụng như những phân tử vận chuyển hydro.

Bệnh pellagra: Thiếu nicotinamid có thể gây ra bệnh pellagra, do khẩu phần ăn thiếu nicotinamid hay do điều trị bằng isoniazid, hoặc do giảm chuyển hóa tryptophan thành acid nicotinic trong bệnh Hartnup, hoặc do u ác tính. Vì các u này cần sử dụng một lượng lớn tryptophan để tổng hợp 5 - hydroxytryptophan và 5 - hydroxytryptamin. Thiếu nicotinamid có thể xảy ra cùng với sự thiếu các vitamin phức hợp B khác. Các cơ quan bị ảnh hưởng chủ yếu do thiếu hụt nicotinamid là đường tiêu hóa, da và hệ thần kinh trung ương. Dùng nicotinamid hoặc acid nicotinic sẽ làm mất các triệu chứng do thiếu hụt gây ra. Những triệu chứng đỏ và sưng lưỡi ở người bị bệnh pellagra sẽ hết trong vòng 24 - 72 giờ sau khi dùng nicotinamid. Triệu chứng tâm thần, nhiễm khuẩn miệng và các màng nhầy khác sẽ hết nhanh chóng. Triệu chứng ở đường tiêu hóa sẽ hết trong vòng 24 giờ.

Dược động học

Nicotinamid được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống và phân bố rộng khắp vào các mô trong cơ thể. Nửa đời thải trừ của thuốc khoảng 45 phút. Nicotinamid chuyển hóa ở gan thành N - methylnicotinamid, các dẫn chất 2 - pyridon và 4 - pyridon, và còn tạo thành nicotinuric. Sau khi dùng Nicotinamid với liều thông thường, chỉ có một lượng nhỏ Nicotinamid bài tiết vào nước tiểu ở dạng không thay đổi; tuy nhiên khi dùng liều lớn thì lượng thuốc bài tiết dưới dạng không thay đổi sẽ tăng lên.

Chỉ định

Điều trị bệnh pellagra.

Liều dùng và cách dùng: uống với 1 cốc nước

Người lớn: mỗi ngày uống 1-2 viên.

Chống chỉ định

Quá mẫn với Nicotinamid. Bệnh gan nặng. Loét dạ dày tiến triển. Xuất huyết động mạch. Hạ huyết áp nặng. Phụ nữ có thai và cho con bú. Trẻ em dưới 12 tuổi.

Thận trọng

Tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiền sử có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khớp do gút và bệnh đái tháo đường.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc không có tác dụng an thần, sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn

Nếu sử dụng liều cao có thể xảy ra buồn nôn, loét dạ dày tiến triển, nôn, chán ăn, đau khi đi, đầy hơi, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rất bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da, khô da, tăng sắc tố, vàng da... các triệu chứng sẽ hết sau khi ngừng thuốc.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc

Sử dụng đồng thời với chất ức chế men khử HGM – CoA có thể làm tăng nguy cơ gây tiêu cơ vân (rhabdomyolysis); với thuốc chẹn alpha-adrenergic trị tăng huyết áp có thể dẫn đến hạ huyết áp quá mức.

Khẩu phần ăn và/hoặc liều lượng thuốc uống hạ đường huyết hoặc insulin có thể cần phải điều chỉnh khi sử dụng đồng thời với nicotinamid.

Dùng chung với các thuốc có độc tính với gan có thể làm tăng thêm tác hại độc cho gan.

Không nên dùng đồng thời với carbamazepin vì gây tăng nồng độ carbamazepin huyết tương dẫn đến tăng độc tính.

Quá liều và xử trí

Khi quá liều, không có biện pháp giải độc đặc hiệu. Sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐĐVN 4.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An, ngày 12 tháng 03 năm 2015

KT. Tổng Giám đốc Công ty

Phó Tổng Giám đốc



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Thu Thủy



KS. Phan Thị Minh Thư