


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần đầu: 1/4/13

MẪU NHÃN

1- Mẫu vỉ (vỉ 15 viên bao phim)



2- Mẫu hộp (hộp 2 vỉ x 15 viên bao phim)



3.- MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:



THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa:

- **Hoạt chất chính:** Eprazinon dihydroclorid50mg
- **Tá dược:** Lactose, tinh bột sắn, magnesi stearat, P.V.P, H.P.M.C, titan dioxyd, dầu thầu dầu, màu erythrosin.

CHỈ ĐỊNH: thuốc làm lỏng các dịch tiết phế quản, dùng cho người lớn trong trường hợp ứ nghẹt phế quản, đặc biệt trong viêm phế quản cấp.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Tiến sử co giật.
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ cho con bú.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:

- Liều thông thường: 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Thời gian điều trị: không quá 5 ngày trừ khi có chỉ định của bác sỹ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Có thể không dung nạp đường tiêu hóa (đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy)
- Rất hiếm gặp: dị ứng da, nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt. Nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt hiếm xảy ra.

Ghi chú: Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG:

- Cần phối hợp trị liệu chuyên biệt trong trường hợp sau: đờm đặc, có mủ hoặc sốt, bệnh phổi hoặc phế quản mạn tính (kéo dài)
- Không dùng kèm thuốc giảm ho hoặc thuốc làm khô chất tiết phế quản trong khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI: chưa có báo cáo lâm sàng về tác dụng gây độc cho thai và sinh quái thai do eprazinon. Tuy nhiên số lượng phụ nữ có thai sử dụng eprazinon chưa đủ nhiều để loại trừ bất cứ nguy cơ nào. Chỉ dùng cho phụ nữ có thai trong trường hợp thật sự cần thiết.

PHỤ NỮ NUÔI CON BÚ: tránh sử dụng thuốc.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: thận trọng khi dùng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC: Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ về những thuốc bạn đang sử dụng.

QUÁ LIỀU XỬ TRÍ: có thể gây ngủ gà, mất điều hòa vận động, động kinh

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 15 viên bao phim.


BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS

CHÚ Ý: Không sử dụng thuốc nếu:

- Viên thuốc bị biến màu, nứt vỡ.
- Vỉ thuốc bị rách.
- Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác sỹ khi gặp những triệu chứng dị ứng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
- Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên nhãn.

 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA
 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM
 ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446
 Nhà máy sản xuất: Ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương





PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

