


MẪU NHÃN

16/187

1. Nhãn trên lọ 10 ml

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
 Lần đầu: 20/12/2012



2. Nhãn hộp 1lọ x 10 ml



Đà Nẵng ngày 15 tháng 07 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Dấu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC – ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DUNG DỊCH THUỐC NHỎ MẮT – NHỎ MŨI
TIOTIC

THÀNH PHẦN : Mỗi lọ 10 ml có chứa :

- Natri clorid.....90 mg
- Tá dược (Thiomersal, nước cất) vừa đủ..... 10 ml

DƯỢC LỰC HỌC

Thuốc nhỏ mắt – nhỏ mũi Tiotic là dung dịch đẳng trương, có tính sát khuẩn nhẹ.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: không có thông tin

CHỈ ĐỊNH :

- Rửa mắt trong các trường hợp mắt bị ngứa, nóng rát do bụi, ghèn mắt.
- Rửa mũi trong các trường hợp chảy nước mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG :

Dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc theo liều trung bình sau:

- Mỗi lần nhỏ từ 2 – 4 giọt cho mỗi mắt hoặc mỗi hốc mũi, ngày 1 – 3 lần.
- Thuốc dùng được cho trẻ sơ sinh.

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

- Chưa có trường hợp được ghi nhận về tác dụng không mong muốn xảy ra trong khi sử dụng dung dịch thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi chứa hoạt chất natri clorid 0,9%

Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC

Khi dùng chung thuốc rửa mắt, rửa mũi cần dùng cách các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi khác tối thiểu 15 phút để tránh lãng phí thuốc do bị trào ra ngoài.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thuốc sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú

SỬ DỤNG CHO NGƯỜI LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc sử dụng an toàn cho người đang lái xe và vận hành máy móc.

THẬN TRỌNG

- Trong quá trình sử dụng thuốc cần bảo quản thuốc cẩn thận, tránh để nhiễm khuẩn. Cần đậy nắp ngay sau khi sử dụng.
- Không dùng thuốc bị chuyển màu.

KHUYẾN CÁO :

- Không dùng thuốc quá 15 ngày sau khi mở nắp.
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng như: vẩn đục, có vật lạ, nấm mốc....
- Không dùng quá liều chỉ định.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Thuốc đóng trong lọ nhựa 10 ml, hộp 1 lọ có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.
- Hạn dùng : 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3760130

Fax: 0511.3760127

Email: info@danapha.com

Điện thoại tư vấn : 0511.3760131

Và phân phối trên toàn quốc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh



ĐS. Mai Đăng Dấu