

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 **MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC**
Tờ hướng dẫn sử dụng

OP.ZEN® Viên Tiêu Sưng Giảm Đau

CÔNG THỨC: cho 1 viên
Cao Tô mộc lượng tương đương cao khô (*Extractum siccum Lignum Sappan*) 160 mg
Tá dược (Tinh bột ngô, lactose, bột cellulose, magnesi stearat, vỏ nang cứng) vớ 1 viên

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:
Hành huyết khứ ứ, tiêu viêm giảm đau.

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các trường hợp tụ máu, sưng đau do chấn thương.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Uống sau khi ăn.
Người lớn: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 2 - 3 lần.
Trẻ em dưới 12 tuổi: Dùng nửa liều người lớn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Không dùng cho phụ nữ có thai, người đang có xuất huyết.
Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc.

DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY: Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.

*Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.*

 **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
1617 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 37517111 - 34756619 FAX: 08. 38752048
Sinh xuất tại **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**
TẠI BÌNH DƯƠNG – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
Ấp Tân Hòa - Xã Tân Vĩnh Hiệp – Huyện Tân Uyên - Bình Dương
E-mail: info@opcpharma.com - Website: www.opcpharma.com


TRƯỞNG
PHÒNG QUẢN LÝ DƯỢC
TRẦN VĂN HẠNH