

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 26/5/18

Busalpain

Tiêu viêm - giảm đau

GMP-WHO
SDK: SX tại: công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Busalpain

Tiêu viêm - giảm đau

Cao khô Huyết giác
(*Extractum siccus Lignum Dracaenae cambodiana*) 0,28g

Busalpain

Tiêu viêm - giảm đau

GMP-WHO
SDK: SX tại: công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

HD: Số lô SX:

Thành phần/ Composition:

Mỗi viên nang cứng chứa/ Each capsule contains:

Cao khô Huyết giác (*Extractum siccus Lignum Dracaenae cambodiana*) 0,28g

tương ứng với Huyết giác (*Lignum Dracaenae cambodiana*) 4,0g

Tá dược vđ/ Excipients q.s.f. viên / 1 capsule

Tiêu chuẩn/ Specification: TCCS/ Manufacturer's

Chỉ định, Chống chỉ định, Cách dùng, Lưu ý dùng và các thông tin khác

Indication, Contraindication, Administration

Dosage and other information:

Xin xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm trong hộp thuốc.

Busalpain

Tiêu viêm - giảm đau

Cao khô Huyết giác

(*Extractum siccus Lignum Dracaenae cambodiana*) 0,28g

GMP - WHO



DHT
HATAPHARM

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

Sản xuất tại/ Manufactured by:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY/

HATAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Tổ dân phố số 4 - La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội/

No. 4 popular group - La Khe - Ha Dong - Ha Noi City

SDK (Reg.No):

Bảo quản/ Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C

/Store in a dry place, below 30°C

Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. / Keep out of reach of children. Carefully read the accompanying instructions before use.

Busalpain

Tiêu viêm - giảm đau

Cao khô Huyết giác

(*Extractum siccus Lignum Dracaenae cambodiana*) 0,28g

GMP - WHO



DHT
HATAPHARM

Box of 2 blisters x 10 capsules

Số lô SX (Lot No):
Ngày SX (Mfg. Date):
HD (Exp. Date):

Đơn hướng dẫn sử dụng thuốc

BUSALPAIN – Tiêu viêm giảm đau

- **Dạng thuốc:** Viên nang cứng.

- **Qui cách đóng gói:** Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng.

Cao khô Huyết giác (*Extractum siccus Lignum Dracaenae cambodiana*) 0,28g

tương ứng với Huyết giác (*Lignum Dracaenae cambodiana*) 4,0g

Tá dược vđ 1 viên

Tá dược gồm: Cellactose 80, Povidon, Magnesi stearat, Bột talc, Colloidal silicon dioxide).

- **Chỉ định:**

Dùng điều trị hiệu quả với các trường hợp va đập dẫn đến tụ máu chấn thương.

Làm tan các vết bầm tím, tụ máu sưng đau do chấn thương, va đập, bị đòn, té ngã, tai nạn lao động – giao thông, hoạt động thể thao.

- **Cách dùng và liều dùng:**

Uống 2 viên/lần x 2-3 lần/ngày (8g/lần x 2-3 lần/ngày)

Liều tối đa 6 viên/ngày (24g/ngày)

- **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai, cho con bú. Người đang chảy máu, người bị rối loạn chảy máu.

- **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Hiếm gặp. Tuy nhiên có thể gây rối loạn tiêu hoá, ỉa chảy. Khi thấy các hiện tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.

* **Ghi chú:** "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

- **Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:** Các thứ cay, nóng, tanh, lạnh làm giảm tác dụng của thuốc.

- **Quá liều và cách xử trí:** Chưa có báo cáo.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. **Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng**

* **Lưu ý:** Khi thấy nang thuốc bị ẩm mốc, nang thuốc bị rách, bóp méo, bột thuốc chuyển màu, nhãn thuốc in số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS

ĐỀ XA TÀM TAY TRẺ EM

" **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổ dân phố số- La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04. 33522203 - 33516101. FAX: 04. 33522203

CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tổng giám đốc



TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thị Khu Thủy



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐS. Nguyễn Bá Lai