

Hướng dẫn sử dụng thuốc - Xin đọc kỹ trước khi dùng	
Viên nén	
Rx	COLCHICIN 1 mg (THUỐC BẢN THEO ĐƠN)
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Colchicin..... : 1 mg Tá dược (Lactose monohydrat, Tinh bột mì, Eragel, PVP K30, Mau Erythrosin, Magnesi stearat, Aerosil) vừa đủ..... : 1 viên	
MÔ TẢ: Viên nén hình trụ tròn, màu hồng, một mặt có vạch ngang, mặt kia có chữ C1, cạnh và thành viên lanh lẵn	
ĐƯỢC LỰC HỌC	
- Colchicin có nhiều tác dụng : + <i>Tác dụng chống bệnh gút :</i> Colchicin làm giảm sự di chuyển của các bạch cầu, ức chế thực bào các vi tinh thể urat và do đó làm ngừng sự tạo thành acid lactic, giữ cho pH tại chỗ được bình thường vì pH là yếu tố tạo điều kiện cho các tinh thể mononatri urat kết tủa tại các mô ở khớp. + <i>Tác dụng chống viêm không đặc hiệu :</i> Colchicin làm giảm sự di chuyển của các bạch cầu, ức chế ứng động hóa học, chuyển hóa và chức năng của bạch cầu da nhân nên làm giảm các phản ứng viêm. + <i>Tác dụng chống phản bào :</i> Colchicin ức chế giai đoạn giữa (metaphase) và giai đoạn sau (anaphase) của quá trình phân chia tế bào do tác động lên thời và lên sự biến đổi gel - sol. Sự biến đổi thê gel và thê sol ở các tế bào đang không phân chia cũng bị ức chế. + <i>Các tác dụng khác :</i> làm tăng sức bền mao mạch, kích thích tuyển vò thượng thận, phản huỷ tế bào lympho, ức chế phô giao cảm, kích thích giao cảm, chống ngứa, gây ia chảy, ức chế invitro khả năng ngưng tập và kết dính tiểu cầu.	
ĐƯỢC DỘNG HỌC	
- Colchicin được hấp thu ở ống tiêu hóa và đi vào vòng tuần hoàn ruột - gan. Nồng độ đỉnh huyết tương xuất hiện sau khi uống 2 giờ. Thuốc ngấm vào các mô, nhất là niêm mạc ruột, gan, thận, lách, trú cơ tim, cơ vân và phổi. Thuốc được đào thải chủ yếu theo phân và nước tiểu (10 - 20%). Khi liều hàng ngày cao hơn 1 mg thì Colchicin sẽ tích tụ ở mô và có thể dẫn đến ngộ độc.	
CHỈ ĐỊNH	
- Đợt cấp của bệnh Gút : Colchicin là thuốc được lựa chọn dùng để làm giảm đau trong các đợt gút cấp. Colchicin còn được dùng để chẩn đoán viêm khớp do gút (nếu có đáp ứng trị liệu bằng colchicin thì chứng tỏ là có tinh thể urat vì tinh thể này khó bị phát hiện, nhất là khi chỉ bị ở các khớp nhỏ). - Để phòng xuất hiện cơn cấp ở bệnh nhân gút mãn tính trong giai đoạn đầu điều trị với allopurinol hay các thuốc tăng đào thải acid uric. Việc sử dụng các thuốc giảm acid uric huyết chỉ được bắt đầu sau khi điều trị khỏi đợt gút cấp ít nhất là 15 ngày và phối hợp với colchicin liều 1mg/ngày trong thời gian từ 1 đến 6 tháng. - Trị liệu dài ngày ở bệnh nhân bị xơ hoá đường mật nguyên phát (colchicin có tác dụng tốt làm giảm tỷ lệ tử vong), bệnh nhân bị xơ gan. - Viêm khớp trong sarcoidose, viêm khớp kèm thêm nốt u hồng ban, viêm sụn khớp cấp có canxi hoà.	

LĨNH LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

LIEU LUONG VA CACH DUNG

- **Đợt gút cấp :** Liều ban đầu là 1 viên, sau đó cứ cách 2 giờ lại uống 1 viên cho đến khi hết đau hoặc bị nôn hay ỉa chảy. Tổng liều trung bình colchicin uống trong 1 đợt điều trị là 4 - 6 viên, đau và sưng khớp thường giảm sau 12 giờ và thường hết hẳn sau khi dùng thuốc 2 - 3 ngày. Nếu uống lại thi đợt uống mới phải cách lần uống cũ 2 - 3 ngày nếu không thi các tổn thương do colchicin gây ra chưa kịp hồi phục và thuốc có thể bị tích tụ.
 - **Để phòng xuất hiện cơn cấp ở bệnh nhân gút mãn tính** trong giai đoạn đầu điều trị với allopurinol hay các thuốc tăng đào thải acid uric : 1 viên/ ngày, uống vào buổi tối.
 - **Điều trị xơ hoá đường mật nguyên phát :** uống 1 viên/ngày, chia 2 lần. Lặp lại nhiều ngày.
 - **Điều trị xơ gan :** Mỗi tuần uống 5 ngày, mỗi ngày 1 - 2 viên.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH

- #### **CHONG CHI ĐỊNH**
- Suy gan nặng, suy thận nặng.
 - Phụ nữ có thai.
 - Bệnh phổi có nguy cơ bị glocom gốc họng, bi bí dài

TÁC DỤNG NGOẠI Ý

TẠC ĐỘNG Thường gặm

- Buồn nôn, nôn, đau bụng.
 - Vết liều cao : ỉa chảy nặng, chảy máu da dày-ruột, nổi ban, tổn thương thận.

It will

- Viêm thần kinh ngoại biên, rụng tóc, rối loạn về máu (trị liệu dài ngày), giảm tinh trùng (hồi phục được).

* Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THAN TRONG

- Khi dùng để điều trị đợt gút cấp phải thận trọng ở người bị suy thận hoặc suy gan.
 - Thận trọng với người mắc bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận hay bệnh tiêu hoá. Bệnh nhân cao tuổi bị suy nhược dễ bị ngộ độc do tích tụ thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Dùng đồng thời Colchicin và ciclosporin làm tăng độc tính của ciclosporin.
- Colchicin làm giảm hấp thu vitamin B₁₂ do tác động độc đối với niêm mạc ruột non. Sự hấp thu này có thể được phục hồi.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ**

 - Thời kỳ mang thai : Tránh dùng colchicin cho người mang thai.
 - Thời kỳ cho con bú : Colchicin được đào thải qua sữa mẹ. Người ta chưa thấy trẻ bị ngộ độc qua đường sữa nhưng người mẹ có thể tránh làm nồng độ thuốc cao trong sữa bằng cách uống thuốc vào buổi tối trước khi ngủ và chờ con bú sau 8 giờ.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHILLÁYE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc

Dung được c Ở i Lai

- QUẢ LIỆU**

 - Liều gây độc là khoảng 10 mg. Liều gây chết là trên 40 mg.
 - Ngộ độc Colchicin chủ yếu là do ý đồ tự tử. Ngộ độc là rất nặng và tỷ lệ tử vong rất cao (30%).
 - Không có điều trị đặc hiệu cho ngộ độc và quá liều Colchicin. Tăng đào thải thuốc bằng rửa dạ dày rồi sau đó là hút tá tràng và than hoạt. Các biện pháp điều trị hỗ trợ là phục vụ cân bằng nước - điện giải, dùng kháng sinh toàn thân và kháng sinh đường tiêu hóa với liều cao, có thể tiêm atropin hoặc morphin để giảm đau bụng, dùng trị liệu chống sốc, cho thở oxy để đảm bảo trao đổi hô hấp tốt. Nếu có suy chức năng thận thì có thể phải lọc thận nhân tạo hoặc thẩm phân phúc mạc.





KHUYẾN CÁO

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN

- Thuốc đóng trong vỏ 20 viên, hộp 01 vỏ, có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

- Để thuốc nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ 20°C-30°C. ĐÊ XA TÂM TAY TRẺ EM.

- Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Thuốc được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

253 – Dũng Sĩ Thanh Khê – TP. Đà Nẵng

Tel : 0511.3760130 Fax : 0511.760127 Email : info@danapha.com

Số điện thoại tư vấn: 0511.3760131

Và được phân phối trên toàn quốc.

Đà Nẵng, ngày 01/11/2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Mai Đăng Đầu

