

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

GASTROLIUM®

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ HOẶC DƯỢC SĨ CÁC TÁC DỤNG KHÔNG MUỐN GẶP PHẢI KHI DÙNG THUỐC

THÀNH PHẦN

Mỗi gói Gastrolium® chứa:

Attapulgit mormoiron hoạt hóa	2,5000 g
Gel khô nhôm hydroxyde và magnesi carbonate	0,5000 g
Tá dược: aspartam, vanilin, cao cam thảo, aerosil, talc vừa đủ	3,0515 g

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Gói thuốc bên trong chứa bột thuốc màu trắng ngà, vị ngọt, mùi vani.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 30 gói x 3,0515g thuốc bột pha hỗn dịch uống, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ

Gastrolium® được chỉ định trong các trường hợp:

- Các triệu chứng của bệnh viêm loét thực quản – dạ dày – tá tràng, thoát vị khe thực quản, di chứng cắt dạ dày, đau thượng vị, rất nóng thực quản – dạ dày. Các trường hợp dùng thuốc có nguy cơ gây viêm loét dạ dày – tá tràng.
- Các triệu chứng bệnh hồi lưu thực quản – dạ dày, hội chứng Zollinger – Ellison.

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY

- Bạn bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Bạn bị suy thận nặng.
- Bạn bị bệnh hẹp đường tiêu hóa.

Báo cho bác sĩ biết nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY

Bạn cần thận trọng khi dùng Gastrolium® và báo ngay cho bác sĩ trong các trường hợp sau:

- Nếu bạn bị chứng to đại tràng do giảm nhu động ruột hoặc nằm liệt giường hay hạn chế hoạt động thể chất (vì có nguy cơ bị u phần). Và bạn cần tiến hành kiểm tra y tế cần thiết trước khi dùng Gastrolium®.
- Nếu bạn bị suy thận và đang thẩm phân mạn tính thì có nguy cơ bị bệnh lý não (do đọng nhôm).

Sau 10 ngày sử dụng thuốc, nếu các triệu chứng không thuyên giảm, kèm theo sốt, nôn mửa, bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

Phụ nữ có thai: Không có nghiên cứu về quái thai trên động vật. Về mặt lâm sàng, sau khi dùng nhiều năm và theo dõi với một số lượng đủ lớn phụ nữ có thai không cho thấy tác động gây biến dạng hoặc độc trên phôi của các thuốc chống acid. Do đó có thể kê đơn các thuốc chống acid cho phụ nữ có thai nếu cần thiết.