


MẪU NHÃN HỘP VÀ VỈ SẢN PHẨM HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO
(SỐ LÔ SX, NSX, HD IN CHÌM TRÊN NHÃN VỈ)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 09 / 09 / 2015



THÀNH PHẦN:
Mỗi viên nang mềm chứa:
- Cao khô rễ Đinh Lăng: 150 mg
(*Isradium Radix Polygonesae Indicae Siccus*)
(tương đương 1875 mg được liệu)
- Cao khô lá Bạch Quế: 50 mg
(*Isradium Folium Cinnae Mollis Siccus*)
(tương đương 3000 mg được liệu)
Tá được: Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanillin, Propyl paraben, Methyl paraben, Titan dioxide, Tartrazin, Allura red, Green-S, vừa đủ 1 viên.
CHỈ ĐỊNH:
- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, suy mạch vành, hội chứng tiền đình, Suy tuần hoàn não có các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ, giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não.
- Người làm việc trí óc căng thẳng gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi.

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn: Uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
Trẻ em: Uống 1 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
CHÔNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BAO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK: XXXX
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, Huyện Cai, Tỉnh Dương
ĐT: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297



10 VỈ X 10 VIÊN NANG MỀM
HOẠT HUYẾT ĐƯỜNG NÃO
MEDISUN
GMP-WHO
LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:
Người lớn: Uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
Trẻ em: Uống 1 viên/lần x 2-3 lần/ngày.
CHÔNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
BAO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.
TIÊU CHUẨN: TCCS
SĐK: XXXX
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ME DI SUN
Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, Huyện Cai, Tỉnh Dương
ĐT: (0650) 3589 036 - FAX: (0650) 3589 297



DS. LÊ MINH HOÀN

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin tham khảo ý kiến bác sỹ

Dạng bào chế: viên nang mềm

Hoạt Huyết Dưỡng Não

Trình bày: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

Công thức: Mỗi viên nang mềm chứa:

- Cao khô rễ Đinh lăng (*Extractum Radix Polysciasea Fruticosea Siccus*) 150 mg
(Tương đương 1875 mg dược liệu)
- Cao khô lá Bạch Quả (*Extractum Folium Ginkgo biloba Siccus*) 50 mg
(Tương đương 3000 mg dược liệu)

Tá dược :

(Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Gelatin, Sorbitol, Glycerin, Vanilin, Propyl paraben, Methyl Paraben, Titan dioxyd, Tartrazin, Allura red, Green – S) vừa đủ một viên nang mềm.

Tính chất:

Đinh Lăng:

- Có tác dụng hoạt hóa vỏ não, tăng cường khả năng tích hợp và tiếp nhận hệ thần kinh, lợi sữa, giải độc. Nên dùng trị suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh, tiêu hóa kém, kém ngủ, phụ nữ sau đẻ ít sữa, kém phát dục
- Tính vị quy kinh: Vị ngọt tính bình quy vào kinh phế, tỳ, thận

Bạch Quả: Lá cây Bạch quả có tác dụng tăng tuần hoàn máu trong động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Thuốc dùng cho những người có biểu hiện não suy; rối loạn trí nhớ, khả năng làm việc trí óc sút kém, mất tập trung tư tưởng. Trong lá có flavonoid và hợp chất diterpen các chất chiết từ bạch quả có thể có ba tác dụng đối với cơ thể người: cải thiện lưu thông máu (bao gồm cả vi tuần hoàn trong các mao mạch nhỏ) đến phần lớn các mô và cơ quan; bảo vệ chống lại các tổn thương tế bào do ôxi hóa các gốc tự do; và nó ngăn chặn nhiều tác động của tác nhân hoạt hóa tiểu huyết cầu (tụ tập tiểu huyết cầu, vón cục máu) có liên quan tới sự phát triển của một loạt các rối loạn tim mạch, thận, hô hấp và hệ thần kinh trung ương. Bạch quả cũng có thể dùng để điều trị chứng tê liệt rời rạc.

Chỉ định

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, suy mạch vành, hội chứng tiền đình. Suy tuần hoàn não có các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ, giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, nhũn não, di chứng não.
- Người làm việc trí óc căng thẳng gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi



Chống chỉ định

- Quá mẫn với các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai
- Người thiếu năng trí tuệ bẩm sinh, rối loạn hành vi, trí tuệ do rối loạn tâm thần, rối loạn đông máu.
- Người đang chảy máu, người có rối loạn đông máu, chảy máu não, pha não cấp.

Liều dùng và cách dùng:

- Người lớn : Uống 2-3 viên/ lần x 2-3 lần/ ngày.
- Trẻ em : Uống 1 viên/ lần x 2-3 lần/ ngày.

Thận trọng

- Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

Tương tác thuốc

Tăng tác dụng của các thuốc chống đông máu.

Phụ nữ có thai và cho con bú

- Không dùng cho phụ nữ có thai vì thuốc có thể làm tăng co bóp tử cung.
- Phụ nữ cho con bú: có thể dùng được vì Đinh lăng có tác dụng lợi sữa.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Chưa có báo cáo đầy đủ

Tác dụng không mong muốn

Đôi khi có tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau đầu, phản ứng dị ứng da.

Thông báo với bác sỹ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Quá liều và xử trí

Chưa có báo cáo, trường hợp quá liều cần loại thuốc khỏi cơ thể (gây nôn, rửa dạ dày) và tiến hành điều trị triệu chứng.

Bảo quản: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Tiêu chuẩn: TCCS số 0650-B-015-07

Logo công ty: 

Nhà sản xuất: **Công ty cổ phần Dược Phẩm ME DI SUN**

Địa chỉ: Số 521 Ấp An Lợi, Xã Hoà Lợi, Huyện Bến Cát, T.Bình Dương

Điện thoại: 0650 3589036 – Fax: 0650 3589297

Bình Dương, ngày 20 tháng 05 năm 2015



TU QU CỤC TRƯỞNG
P. TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thu Thủy



Giám Đốc công ty

ĐS. Lê Minh Hoàn