

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH:

LILONTON Injection 3000 mg/ 15 ml

1. KHUYẾN CÁO:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

2. THÀNH PHẦN, HẠM LƯỢNG CỦA THUỐC:

Mỗi ống thuốc tiêm 15 ml chứa:

Hoạt chất: Piracetam.....3000 mg

Tá dược: Natri bisulfít, dung dịch Natri carbonat hoặc dung dịch acid hydrochloric 10% để điều chỉnh độ pH, nước cất pha tiêm.

3. MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Dung dịch trong suốt, không màu.

4. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 5 ống tiêm (15 ml/ống tiêm).

5. THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ:

Piracetam tác động trên não và hệ thần kinh, được xem là bảo vệ các cơ quan này không bị thiếu oxy.

Piracetam được dùng phối hợp với các thuốc khác để điều trị chứng rung giật cơ. Đây là bệnh do hệ thần kinh làm cơ bị co giật không kiểm soát, thường ở tay và chân.

Piracetam cũng được dùng để cải thiện tuần hoàn não và tình trạng sa sút trí tuệ ở người già.

6. NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG:

Luôn luôn uống đúng liều bác sĩ kê đơn cho bạn.

Người lớn

Uống bao nhiêu thuốc và uống khi nào

- Liều khởi đầu thông thường là 7,2 g mỗi ngày, chia làm 2-3 lần. Vài trường hợp, liều khởi đầu có thể lên đến 15 g.
- Khi bắt đầu dùng thuốc này, thầy thuốc có thể nói bạn tăng dần liều dùng để đảm bảo bạn dùng thuốc ở liều tốt nhất cho bệnh của bạn.
- Cần thận theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc.

Uống thuốc như thế nào

- Uống nguyên viên với nước.
- Dùng mở viên ra, vì piracetam có vị rất đắng.

Người cao tuổi và bệnh nhân có vấn đề về thận

Nếu bạn cao tuổi hoặc có vấn đề về thận, bác sĩ có thể giảm liều dùng.

Ngưng dùng piracetam

Bạn không nên tự ý ngưng dùng piracetam, phải hỏi bác sĩ nếu muốn ngưng dùng thuốc.

Ngưng dùng thuốc đột ngột có thể làm cơ bị co giật.

Nếu bạn có các câu hỏi về cách sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.

7. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY:

Không dùng piracetam nếu...

- Bạn bị dị ứng với hoạt chất piracetam
 - Bạn bị dị ứng với bất cứ tá dược nào của thuốc này.
 - Bạn từng có vấn đề về thận nghiêm trọng
 - Bạn bị bệnh Huntington (cũng gọi là múa giật Huntington)
 - Bạn từng bị xuất huyết não
- Nếu bạn bị bất cứ trường hợp nào kể trên, không uống piracetam và nói với bác sĩ hoặc dược sĩ.**

8. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Cũng như tất cả các thuốc khác, piracetam có thể gây tác dụng không mong muốn, nhưng không phải ai cũng bị các tác dụng không mong muốn này.

Bạn có thể chú ý các tác dụng không mong muốn sau:

- Phản ứng dị ứng, thở khó, phù, sốt
- Chảy máu do khiếm khuyết trong cơ chế đông máu
- Không khỏe
- Áo giáp
- Khó giữ thăng bằng và ổn định khi đứng
- Lo âu và kích động
- Mơ hồ
- Không nghỉ ngơi
- Lo âu
- Buồn ngủ
- Trầm cảm
- Yếu đuối
- Chóng mặt
- Tăng cân
- Đau dạ dày
- Tiêu chảy
- Có cảm giác bị bệnh
- Nhức đầu
- Mất ngủ
- Phù da, đặc biệt là vùng mặt
- Nổi mẩn đỏ trên da, ngứa

Nếu bạn có bất cứ tác dụng không mong muốn nào, hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ. Cũng có thể có các tác dụng không mong muốn khác chưa được liệt kê ở đây.

9. NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY:

Hãy nói với thầy thuốc nếu bạn đang dùng các thuốc sau:

- Chiết xuất tuyến giáp hoặc thyroxin
- Thuốc chống đông máu như warfarin hoặc là aceno-coumarol
- Aspirin liều thấp
- Bất cứ thuốc nào khác, kể cả thuốc không kê đơn.

10. CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC:

Thuốc này sẽ do y tá hoặc bác sĩ tiêm cho bạn. Vì vậy bạn sẽ không quên dùng thuốc.

11. CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO:

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ không quá 30°C.

12. NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU:

Khi dùng quá liều, các tác dụng không mong muốn của thuốc có thể nghiêm trọng.

13. CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DỪNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO:

Thuốc này sẽ do y tá hoặc bác sĩ tiêm cho bạn. Vì vậy bạn sẽ không dùng quá liều.

14. NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DỪNG THUỐC NÀY:

Hỏi bác sĩ trước khi dùng piracetam nếu:

- Bạn nghĩ rằng thận của bạn có vấn đề (Bác sĩ có thể cho bạn dùng thuốc với liều thấp hơn)
- Bạn có bất cứ vấn đề chảy máu nào.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Nếu bạn có thai hoặc muốn có thai hoặc đang cho con bú, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi uống piracetam. Nếu bạn đang uống thuốc này, bạn hãy dùng biện pháp tránh thai. Nếu bạn đang uống piracetam và bạn có thể có thai, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ ngay.

Tác động trên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Piracetam có thể gây buồn ngủ và mất thăng bằng. Nếu bạn bị như vậy, không lái xe hay vận hành máy móc.

15. KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ:


Nếu bạn có bất kỳ phản ứng không mong muốn nào, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

16. HẠN DÙNG CỦA THUỐC:

48 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng khi thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

17. TÊN ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

 SIU GUAN CHEM. IND. CO., LTD.
No. 128 Shin Min Road, Chia Yi, ĐÀI LOAN
PIC/S GMP Tel.: 886-5-2360636 Fax: 886-5-2865232

18. NGÀY XEM XÉT SỬA ĐỔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: