

LUOTAI Soft capsule

Thành phần: Mỗi viên có chứa Panax notoginseng saponins 100mg

Tá dược: Glycerol, Gelatin, Ethylparaben, Macrogol, nước

Mô tả: Viên nang mềm hình oval có chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Tác dụng dược lý:

- Chống thiếu máu não, giảm tỷ lệ đột quỵ gây ra bởi tổn thương do hiện tượng tưới máu lại vùng não bị thiếu máu; làm giảm phản ứng nồng độ Ca trong mô não bị tổn thương.
- Tăng cường dòng máu não - tim, cải thiện huyết động học.
- Ức chế sự tạo huyết khối (tỷ lệ ức chế đạt 92,1%) và cải thiện hoạt tính của t-PA.
- Ức chế kết tập tiểu cầu gây ra bởi ADP và acid arachidonic trên thromb (đạt tới 83,7%).
- Kéo dài thời gian đông máu và bảo vệ tissued não khỏi sự thiếu oxy.
- Cải thiện khả năng đề kháng với tình trạng thiếu oxy trên chuột dưới áp suất bình thường, tăng khả năng đề kháng với tình trạng thiếu oxy của tế bào cơ tim, chống lại tổn thương gây ra do sự tái cung cấp oxy.

Hoạt tính: Luotai có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, phân tán cục máu đông, làm bền vững thành mạch. Luotai cũng có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu, cải thiện dòng máu não.

Chỉ định:

- Đột quỵ, liệt nửa người, nhồi máu não do xơ vữa động mạch và huyết khối.
- Hậu quả của tai biến mạch máu não - tim mạch.
- Tắc nghẽn mạch máu vòm mạc do huyết khối.
- Bệnh mạch máu tim như đau thắt ngực, đau ngực

Liều dùng và cách dùng:

Đợt điều trị ít nhất 4 tuần. Dùng 1-2 viên/ngày.

Chống chỉ định:

- Phá hủy của xuất huyết não.
- Bệnh nhân dị ứng với Panax notoginseng saponin và Panax ginseng saponin.
- Phụ nữ mang thai và cho con bú.

Lưu ý và thận trọng đặc biệt khi sử dụng:

- Trong quá trình điều trị có thể xuất hiện hiện tượng đỏ hoặc sưng nhẹ ở đầu tuy nhiên tình trạng này không ảnh hưởng đến kết quả điều trị.
- Không cần dừng thuốc nếu có nổi mẩn nhẹ tuy nhiên cần ngừng điều trị ngay lập tức nếu có nổi mẩn trầm trọng xảy ra và phải có liệu pháp xử lý thích hợp.
- Không nên lái xe hoặc làm việc ở độ cao trong thời gian sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác:

Không có ghi nhận nào về tương tác thuốc cũng như các dạng tương tác khác.

Các tác dụng không mong muốn:

Khô họng, đỏ mặt, đánh trống ngực, nổi mẩn có thể xảy ra và sẽ hết sau khi dừng điều trị. Rất hiếm khi xảy ra phản ứng quá mẫn.

Quá liều: Không có ghi nhận.

Bảo quản: Ở nhiệt độ phòng, trong hộp kín.

Hạn sử dụng: 2 năm kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất

Đóng gói: Lọ 30 viên, 6 lọ trong 1 hộp.

Số đăng ký: VN-9723-10

Trong thời gian sử dụng, nếu có phản ứng có hại xảy ra, hãy thông báo cho thầy thuốc biết. Nếu cần thêm thông tin hãy liên hệ với thầy thuốc. Để ngoài tầm với của trẻ em.

Nhà sản xuất: KPC Pharmaceuticals, Inc.

Địa chỉ: Qigongli, West Suburb, Kunming, Yunnan, P.R.China.