


MẪU HỘP VIÊN NANG CỨNG METHIONIN

Kích thước thực : 9,0 cm x 5,2cm x 5,2 cm



Ngày 29 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



MẪU NHÃN VIÊN NANG CỨNG METHIONIN

Kích thước thực : 11,0 cm x 4,3 cm

CÔNG THỨC Methionin 250mg Tá dược vô 1 viên nang	100 VIÊN NANG	LIỀU DÙNG * Người lớn: uống mỗi lần 2 viên x 3 lần/ngày. * Trẻ em: ½ liều người lớn.
CHỈ ĐỊNH Hỗ trợ điều trị các chứng vàng da, viêm gan do nhiễm độc, xơ gan.	Methionin	BẢO QUẢN Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH Dị ứng với các thành phần của thuốc. Người bệnh bị nhiễm toan. Tổn thương gan nặng.	250 mg	ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
SĐK : Tiêu chuẩn : TCCS	 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM	Ngày SX : Số lô SX : HD :



ph

Ngày 29 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sử*



MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC VIÊN NANG CỨNG METHIONIN 250mg

Kích thước thực : 9,2cm x 16,3 cm

Methionin

Viên nang cứng - Methionin 250 mg

CÔNG THỨC : Cho 1 viên nang cứng

- Methionin 250 mg
- Tá dược: Tinh bột ngô, Bột talc, Nước tinh khiết.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:

DƯỢC LỰC HỌC:

Methionin là một acid amin thiết yếu có trong thành phần của chế độ ăn và trong công thức của các chế phẩm đa acid amin để nuôi dưỡng. Methionin tăng cường tổng hợp glutathion và được sử dụng thay thế cho Acetylcystein điều trị ngộ độc Paracetamol để phòng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Methionin được hấp thu ở đường tiêu hóa và chuyển hóa ở gan.

CHỈ ĐỊNH :

Hỗ trợ điều trị các chứng vàng da, viêm gan do nhiễm độc, xơ gan.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :

- Dị ứng với các thành phần của thuốc.
- Người bệnh bị nhiễm toan.
- Tổn thương gan nặng.

THẬN TRỌNG:

- Ở những người đã bị suy gan, Methionin có thể làm cho gan tổn thương nặng thêm.
- Ở những người đã bị suy gan hoặc tổn thương gan, Methionin có thể làm bệnh về não do gan tiến triển mạnh. Vì vậy không được dùng Methionin để điều trị ngộ độc Paracetamol nếu đã quá 12 giờ tính từ lúc uống thuốc quá liều. Nên thận trọng với người lái xe và vận hành máy móc vì có thể gây ngủ gà.

Methionin có thể làm giảm tác dụng của levodopa.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

- Đôi khi gặp các triệu chứng: buồn nôn, nôn, ngủ gà, dễ bị kích thích.
- Gây nhiễm toan chuyển hóa và tăng nitơ huyết ở người bị suy chức năng thận.
- Thông báo ngay cho bác sĩ biết tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chưa có dữ liệu.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Nên thận trọng vì có thể gây buồn ngủ.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Chưa có thông tin.

LIỀU DÙNG :

- Người lớn : uống mỗi lần 2 viên x 3 lần/ngày.
- Trẻ em : uống ½ liều người lớn.

HẠN DÙNG :

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI :

Chai 100 viên nang.

BẢO QUẢN :

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

- Viên nang cứng METHIONIN 250 mg đạt theo TCCS.
- Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.
- Sản xuất tại: Nhà máy GMP-WHO số 930 C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T. PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32@ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngày 29 tháng 06 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. *Lê Thanh Sử*