

Mogastic 80

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng ghi trên nhãn

Thành phần: Công thức cho 1 viên:

Simethicon	80 mg
Tá dược vđ	1 viên
(Compressuc, Magnesi oxid (light), Aspartam, Dicalci phosphat (khan), Menthol, Tinh dầu bạc hà, Magnesi stearat).	

Mô tả sản phẩm: Viên nén nhai, màu trắng, hương bạc hà, hai mặt trơn, đường kính 10,5 mm.

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nén nhai.

Thuốc dùng cho bệnh gì: Thuốc này chứa simethicon dùng:

Chống đầy hơi, làm giảm triệu chứng khó chịu do có quá nhiều khí trong đường tiêu hóa, như căng đường tiêu hóa trên, cảm giác nặng, đầy bụng, khó tiêu.

Bác sĩ có thể chỉ định dùng simethicon cho các trường hợp không liệt kê trên đây.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:

Cách dùng: Nhai kỹ viên thuốc trước khi nuốt.

Liều dùng:

Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần nhai kỹ 1 viên, ngày 4 lần, dùng sau bữa ăn và lúc đi ngủ hay bất kỳ lúc nào có cảm giác đầy bụng.

Không dùng quá 6 viên mỗi ngày, trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

Khi nào không nên dùng thuốc này:

Mẫn cảm với simethicon hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Thũng hoặc tắc ruột (đã biết hoặc nghi ngờ).

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Chưa có tác dụng không mong muốn nào được báo cáo.

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

Nếu bạn đang được điều trị bằng levothyroxin cho chứng rối loạn tuyến giáp, sử dụng simethicon có thể làm giảm hấp thu levothyroxin, dẫn đến giảm hiệu quả của levothyroxin, gây giảm năng tuyến giáp. Nếu dùng đồng thời hai thuốc này phải uống cách nhau ít nhất 04 giờ.

Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc dạ dày hoặc thuốc kháng acid nào vì các thuốc này có thể chứa simethicon, nếu uống chung bạn có thể tăng lượng simethicon đưa vào cơ thể.

Trong thời gian dùng thuốc này bạn nên tránh đồ uống có carbonat (soda hoặc nước ngọt) hoặc các thức ăn có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

Do simethicon chỉ được sử dụng khi cần thiết, bạn khó có khả năng bỏ lỡ một liều.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

Để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Gọi cho bác sĩ của bạn hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Các tình trạng cần thận trọng:

Không dùng thuốc này để điều trị cơn đau bụng ở trẻ em vì chưa có đủ thông tin về lợi ích và độ an toàn của simethicon cho lứa tuổi này.

Không dùng thuốc quá liều khuyến cáo ở Trẻ hướng dẫn sử dụng thuốc này hoặc chỉ định của bác sĩ.

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ dự định có thai, đang có thai hoặc cho con bú hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn trước khi dùng thuốc này do thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi hoặc trẻ đang bú mẹ.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ:

Phụ nữ dự định có thai, đang có thai hoặc cho con bú.

Đang sử dụng loại thuốc khác, bao gồm cả thuốc kê đơn và không kê đơn, thuốc từ dược liệu hoặc thực phẩm chức năng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Các đặc tính dược lực học, dược động học:

Các đặc tính dược lực học:

Simethicon là hỗn hợp polydimethylsiloxan và silicon dioxyd, có tác dụng chống tạo bọt. Simethicon làm giảm sức căng bề mặt của các bọt khí, làm vỡ hoặc kết tụ chúng lại và bị tống ra ngoài, nhờ đó có tác dụng chống đầy hơi. Vì vậy, simethicon có tác dụng làm giảm các triệu chứng do có quá nhiều khí ở đường tiêu hóa gây ra ở cả người lớn và trẻ em, như khí nuốt phải nhiều khí vào dạ dày hoặc có một số chất khí được tạo ra ở ruột do sự giáng hóa của những thức ăn không được tiêu hóa bởi các vi khuẩn ruột.

Simethicon đã được chứng minh có tác dụng chống *Helicobacter pylori*. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của simethicon đối với *H. pylori* từ 64 - 128 mg/lit, nồng độ này có thể đạt được ở dạ dày với liều điều trị.

Có một số chế phẩm của simethicon phối hợp với thuốc kháng acid, thuốc chống co thắt hoặc các enzym tiêu hóa, nhưng sử dụng các chế phẩm phối hợp có định hướng thường không có lý do xác đáng và các sản phẩm này chưa được đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, ở một số nước vẫn sử dụng chế phẩm simethicon phối hợp với thuốc kháng acid để làm suy giảm đầy hơi và có thể làm giảm triệu chứng nấc.

Các đặc tính dược động học:

Simethicon có tính trơ về sinh lý. Sau khi uống, thuốc không hấp thu qua đường tiêu hóa, cũng không cản trở bài tiết acid dạ dày hoặc hấp thu các chất dinh dưỡng.

Simethicon được thải trừ dưới dạng không đổi trong phân.

Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định:

Chỉ định:

Chống đầy hơi, làm giảm triệu chứng khó chịu do có quá nhiều khí trong đường tiêu hóa, như căng đường tiêu hóa trên, cảm giác nặng, đầy bụng, khó tiêu.

Bác sĩ có thể chỉ định dùng simethicon cho các trường hợp không liệt kê trên đây.

Liều dùng:

Liều thường dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Mỗi lần nhai kỹ 1 viên, ngày 4 lần, dùng sau bữa ăn và lúc đi ngủ hay bất kỳ lúc nào có cảm giác đầy bụng.

Không dùng quá 6 viên mỗi ngày, trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

Cách dùng:

Nhai kỹ viên thuốc trước khi nuốt.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với simethicon hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thũng hoặc tắc ruột (đã biết hoặc nghi ngờ).

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

Các tình trạng cần thận trọng:

Không dùng thuốc này để điều trị cơn đau bụng ở trẻ em vì chưa có đủ thông tin về lợi ích và độ an toàn của simethicon cho lứa tuổi này.

Không dùng quá liều khuyến cáo.

Tránh đồ uống có carbonat (soda hoặc nước ngọt) hoặc các thức ăn có thể làm tăng lượng khí trong dạ dày.

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai:

Không rõ simethicon có qua được nhau thai hay không tuy hấp thu của simethicon qua ruột bị hạn chế, để thận trọng nên tránh dùng thuốc này cho người mang thai.

Thời kỳ cho con bú:

Không biết simethicon có được bài tiết vào sữa mẹ hay không, cũng như không rõ khả năng gây ra các ADR ở trẻ bú mẹ. Cần cân nhắc nguy cơ/lợi ích khi sử dụng thuốc này cho bà mẹ đang cho con bú.

Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có nghiên cứu nào về ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác:

Levothyroxin: Dùng đồng thời levothyroxin và simethicon có thể làm giảm hấp thu levothyroxin, dẫn đến giảm hiệu quả của levothyroxin, gây giảm năng tuyến giáp. Nếu dùng đồng thời hai thuốc này phải uống cách nhau ít nhất 04 giờ. Theo dõi mức TSH và/hoặc các đánh giá khác về chức năng tuyến giáp khi bắt đầu dùng hoặc khi ngừng dùng simethicon trong khi điều trị bằng levothyroxin.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa có tác dụng không mong muốn nào được báo cáo.

Quá liều và cách xử trí:

Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.



Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
Sản xuất tại: Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất Dược phẩm Agimexpharm
Đường Vũ Trọng Phụng, Khóm Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
ĐT: 0296.3857300 Fax: 0296.3857301