

CÔNG THỨC: cho một tuýp:

Tên thành phần	Hàm lượng	
	Tuýp 20g	Tuýp 40g
Nọc rắn Hồ mang khô (<i>Hemomen Cobrae Naja</i>)	0,04mg	0,08mg
Camphor	0,6g	1,2g
Methyl salicylate	0,8g	1,6g
Tinh dầu bạch đàn	400mg	800mg
Tá dược vừa đủ	20g	40g

(Vaselin, Lanolin, Paraffin, Sáp ong, Ethanol 96%).

TÍNH CHA T: NAJATOX là thuốc mỡ bôi da giảm đau kháng viêm, phối hợp gồm:

- Nọc rắn Hồ mang: rất độc, có bản chất là các peptit hoặc protein. Nọc rắn là một thuốc chống viêm rất mạnh dùng để chữa đau nhức...
- Methyl salicylate: thuộc nhóm giảm đau, kháng viêm không steroid, có tác dụng kháng viêm giống các salicylate khác. Methyl salicylate cho sức nóng mạnh, làm giãn các mạch gần bề mặt da, nhờ vậy các hoạt chất dễ dàng thấm qua da làm giảm ngay các cơn đau liên quan đến các bệnh thấp khớp, viêm khớp, viêm mô cơ, đau lưng, đau cơ, bong gân.
- Tinh dầu bạch đàn, Camphor: xoa bóp chữa đau nhức, vết sưng, gây xung huyết, đau tê thấp.

CHỈ ĐỊNH:

Dùng trong các trường hợp đau khớp, đau dây thần kinh và đau cơ như: viêm đa khớp dạng thấp, viêm khớp mãn tính, thoái hóa khớp, viêm khớp gò, viêm khớp cổ tay, giãn dây chằng khớp vai, đau nhức cơ nặng, viêm chụ vai.

CÁCH DÙNG:

Thoa thuốc lên chỗ đau và xoa bóp để da dễ hấp thu thuốc, ngày 3 lần. Thoa liên tục trong 1 - 3 tuần lễ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Không thoa thuốc chung quanh mắt, niêm mạc mắt, vùng da bị kích ứng, vết thương hở.
- Phụ nữ mang thai.

THẬN TRỌNG:

- Cần thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân có tiền căn dị ứng với thuốc hay mỹ phẩm như sản ngứa, nhiễm độc da.
- Chỉ dùng ngoài da, không được uống.
- Không băng kín khi thoa thuốc.
- Nếu thuốc dính vào mắt, rửa kỹ với nước hay nước ấm.
- Đối với trẻ em, chỉ sử dụng thuốc dưới sự giám sát của người lớn.
- Ngừng sử dụng thuốc nếu bị sản, ngứa, kích ứng kéo dài.

THỜI KỲ MANG THAI-CHO CON BÚ:

- Không được sử dụng cho phụ nữ mang thai.
- Thận trọng khi sử dụng đối với phụ nữ cho con bú: không thoa thuốc lên vùng vú khi cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Có thể gây dị ứng tại chỗ, sẽ hết khi ngưng dùng thuốc hoặc dùng các loại thuốc kháng histamin.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Chưa thấy có tương tác với các loại thuốc uống khác.
- Tránh sử dụng cùng lúc với các loại thuốc thoa ngoài da khác.

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUẢ LIỆU & CÁCH XỬ TRÍ:

- Chưa thấy báo cáo về trường hợp quá liều do sử dụng thuốc để thoa ngoài da.
- Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

- Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤ 30°C, tránh ánh sáng.

TRÌNH BÀY:

- Tuýp 20g thuốc mỡ bôi da. Hộp 1 tuýp.
- Tuýp 40g thuốc mỡ bôi da. Hộp 1 tuýp.

Sản xuất theo TCCS

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam