

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thường gặp:

- + Tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, nôn, cảm thấy vị kim loại, ỉa chảy.
- + Tim mạch: hạ huyết áp tư thế đứng
- + Hệ thần kinh trung ương: hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, rối loạn tâm thần, ngủ lơ mơ.
- + Gan: viêm gan, vàng da
- + Thần kinh - cơ và xương: yếu ớt
- + Nội tiết: Phù, đau vú
- + Tiết niệu, sinh dục: ra máu (chảy máu thường xuyên hay kéo dài, và ra máu ít), vô kinh.

- Ít gặp:

- + Toàn thân: thay đổi cân nặng
- + Thần kinh: giảm dục tính
- + Da: râm lòng, ra mồ hôi, rụng tóc
- + Nội tiết và chuyển hóa: giảm đường huyết
- + Tiêu hóa: đau bụng
- + Mắt: viêm dây thần kinh thị giác, nhìn mờ
- + Mũi: rối loạn khứu giác

- Hiếm gặp:

- + Thần kinh trung ương: viêm dây thần kinh ngoại biên, dị cảm, động kinh, run
- + Da: ban, nhạy cảm với ánh sáng
- + Nội tiết và chuyển hóa: tăng chuyển hóa, suy tim
- + Tiêu hóa: Viêm miệng
- + Huyết học: giảm tiểu cầu, ban xuất huyết
- + Loãng xương, gãy liên sườn đường khớp sơ trẻ em

Ghi chú: "Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".

THẬN TRỌNG:

Levonorgestrel được dùng thận trọng đối với những người bị đông kinh, bệnh van tim, bệnh tuần hoàn não, người bị đái tháo đường, u xơ tử cung, và với người có tăng nguy cơ có thai ngoài tử cung. Do thuốc có thể gây ứ dịch nên phải theo dõi cẩn thận ở người hen suyễn, phù thũng

Phải thăm khám và hỏi kỹ bệnh sử người bệnh trước khi kê đơn ethinylestradiol và chú ý đặc biệt đến huyết áp, vú và các cơ quan ở bụng và tiểu khung. Như thường lệ, thuốc uống tránh thai không được kê đơn quá 1 năm mà không thăm khám lại bệnh nhân. Nữ giới có rối loạn chức năng tim hoặc thần, đông kinh, đau nửa đầu, hen hoặc u xơ tử cung đòi hỏi phải theo dõi cẩn thận khi dùng thuốc vì các bệnh này có thể nặng lên. Nguy cơ bệnh huyết khối nghẽn mạch do dùng ethinylestradiol tăng theo tuổi và hút thuốc lá. Do đó, nữ trên 35 tuổi khi dùng thuốc phải được khuyến cáo hút thuốc lá. Phải định lượng nồng độ glucose, triglycerid trong máu, lúc đầu và định kỳ đối với người bệnh có khuynh hướng bị đái tháo đường hoặc tăng triglycerid huyết.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Khi sử dụng quá liều có thể gây buồn nôn và khi ngừng thuốc có thể gây chảy máu ở phụ nữ. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không ảnh hưởng đến lái xe và vận hành máy móc.

HẠN DÙNG: 60 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng nếu thấy viên thuốc bị phồng, mốc, biến màu hoặc thấy hiện tượng khác lạ và báo cho nhà sản xuất biết

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

Tiêu chuẩn sử dụng: Đạt BP 2010.



Sản xuất tại:

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - Namha Pharma
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Tel: 0228 3649408 Fax: 0228 3644650



Phân phối bởi:

Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng
Địa chỉ: Tầng 13, toà nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 024 3795 4165 www.goldenchoice.com.vn