

R<sub>x</sub> Thuốc bán theo đơn

## NYST<sup>®</sup> THUỐC RƠ MIỆNG

### CÔNG THỨC:

Nystatin .....25000 IU

Tá dược (Sorbitol, Vanilin) .....vừa đủ 1 gói

### DƯỢC LỰC HỌC:

Nystatin liên kết với sterol của màng tế bào các nấm nhậy cảm nên Nystatin làm thay đổi tính thấm của màng nấm. Nystatin dung nạp tốt ngay cả khi điều trị lâu dài và không gây kháng thuốc.

Nystatin có tác dụng chống bội nhiễm *Candida albicans* đường tiêu hóa trong quá trình điều trị kháng sinh.

### DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Nystatin được hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không được hấp thu qua da hay niêm mạc khi dùng tại chỗ, thải trừ chủ yếu qua phân dưới dạng chưa chuyển hóa.

### CHỈ ĐỊNH:

Bệnh Candida miệng (đẹn): tưa miệng, viêm miệng, lưỡi bị mất nhú, lưỡi đẹn, viêm họng do *Candida albicans*.

### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

*Trẻ sơ sinh:* mỗi lần dùng nửa gói, ngày 2 lần.

*Trẻ em:* mỗi lần dùng 1 gói, ngày 2 lần.

*Người lớn:* mỗi lần dùng 2 gói, ngày 2 lần.

Pha thuốc với 1 muỗng cà phê nước đun sôi để nguội, dùng gạc tiệt trùng quấn vào ngón tay, thấm thuốc rơ lưỡi, họng,...nơi có nấm mọc. Trong vòng 20 phút sau khi rơ miệng không được ăn hoặc uống. Chỉ pha thuốc đủ dùng cho 1 lần, nuốt thuốc không sao.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Tiền sử quá mẫn với Nystatin.

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

### THẬN TRỌNG:

Nếu có phản ứng quá mẫn xảy ra, nên ngừng thuốc ngay và có biện pháp xử lý thích hợp.

## **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**

Không có nguy cơ gì được thông báo.

Nystatin không bài tiết vào sữa mẹ.

## **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Nystatin hầu như không độc và không gây mất cảm và dung nạp tốt ở tất cả các lứa tuổi kể cả trẻ nhỏ suy yếu và ngay cả khi dùng kéo dài.

*Ít gặp:* Da: Mày đay, ngoại ban.

*Hiếm gặp:* Gây kích ứng tại chỗ. Hội chứng Steven - Johnson.

*Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.*

## **TƯƠNG TÁC THUỐC:**

Thuốc bị mất tác dụng kháng Candida albicans nếu dùng đồng thời với Riboflavin phosphat.

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:** chưa có báo cáo.

**DẠNG THUỐC VÀ TRÌNH BÀY:** Thuốc bột. Hộp 10 gói.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

**TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:** TCCS.

*Để xa tầm tay trẻ em*

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*

*Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ*

*Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của Thầy thuốc*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

1017 HỒNG BÀNG, Q.6 – TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT: 08.37517111 – 08.38778899 FAX: 08.38752048

**SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC**

ẤP TÂN HÓA, XÃ TÂN VINH HIỆP, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG.

E-mail: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com