



NYSTATIN 50000 IU

Viên bao đường

CÔNG THỨC:

Nystatin.....500.000 IU

Tá dược vừa đủ.....1 viên

(Colloidal silicon dioxide, Lactose, Magnesium stearate, Tinh bột sắn, Gôm Lacque, Dầu thầu dầu, Talc, Ethanol 96%, Đường trắng, Gôm Arabic, Methyl hydroxybenzoate, Propyl hydroxybenzoate, Sáp ong, Paraffin, Màu Brown HT, Màu Tartrazine, Màu Erythrosine).

DƯỢC LỰC HỌC:

- Nystatin là kháng sinh kháng nấm được chiết xuất từ dịch nuôi cấy nấm *Streptomyces noursei*. Nystatin có tác dụng chủ yếu trên nấm *Candida albicans*.

- Cơ chế tác dụng: do liên kết với sterol của màng tế bào các nấm nhạy cảm nên Nystatin làm thay đổi tính thấm của màng nấm. Nystatin dung nạp tốt ngay cả khi điều trị lâu dài và không gây kháng thuốc.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Nystatin hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không được hấp thu toàn thân khi dùng điều trị qua da hay niêm mạc, thải trừ chủ yếu qua phân dưới dạng chưa chuyển hóa.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị nhiễm nấm *Candida albicans* ở niêm mạc miệng và hầu: tưa lưỡi, viêm miệng, viêm họng,...

- Điều trị bệnh do nấm *Candida* ở thực quản, dạ dày, ruột.

- Dự phòng nhiễm nấm *Candida* ruột ở bệnh nhân sử dụng kháng sinh phổ rộng.

CÁCH DÙNG:

- Theo chỉ dẫn của bác sỹ.

- Liều đề nghị: + Người lớn: uống 1 - 2 viên/lần, ngày 3 - 4 lần.

+ Trẻ em: nửa liều của người lớn.

- Trường hợp nhiễm *Candida* ở miệng hầu, nên nghiền viên thuốc ra trước khi sử dụng để thuốc có thể tiếp xúc trực tiếp với sang thương.

- Điều trị phải tiếp tục ít nhất 48 giờ sau khi hết triệu chứng lâm sàng để ngừa tái phát.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

Không chỉ định dùng cho nhiễm nấm toàn thân vì thuốc không hấp thu qua đường tiêu hóa.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

- Thận trọng khi dùng thuốc ở phụ nữ mang thai.

- Nystatin không bài tiết vào sữa mẹ, phụ nữ cho con bú có thể dùng thuốc.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Nystatin hầu như không độc, không gây mẫn cảm và dung nạp tốt ở tất cả các lứa tuổi kể cả trẻ nhỏ suy yếu và ngay cả khi dùng kéo dài.

- Ở những người bệnh mẫn cảm với candidin, dùng thuốc uống có thể gây biểu hiện dị ứng do tiêu diệt đột ngột nấm *Candida* và giải phóng nhiều candidin. Khi xảy ra phải ngừng Nystatin ngay.

- Ít gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa sau khi uống thuốc, mày đay, ngoại ban.

- Hiếm gặp: gây kích ứng tại chỗ, hội chứng Steven-Johnson.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Nystatin bị mất tác dụng kháng *Candida albicans* nếu dùng đồng thời với Riboflavin phosphate.

- Tránh dùng Nystatin cùng với các thuốc làm thay đổi nhu động ruột, các thuốc bao niêm mạc tiêu hóa vì làm cản trở tác dụng của Nystatin.

QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:

- Rửa dạ dày, sau đó dùng thuốc tẩy.

- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BẢO QUẢN:

Nơi khô (độ ẩm ≤ 70%), nhiệt độ ≤ 30°C, tránh ánh sáng.

TRÌNH BÀY:

Vi 8 viên bao đường. Hộp 2 vi.

Tiêu chuẩn áp dụng: ĐDVN IV

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
297/5 Lý Thường Kiệt - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam