

Thuốc bán theo đơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH



1. Tên thuốc: OMNIVATIN

2. Các câu khuyến cáo

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ.

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: Mỗi viên nén bao phim chứa:

Hoạt chất:

Quetiapin (dưới dạng quetiapin fumarat)100,00 mg.

Tá dượcvừa đủ 1 viên.

(Avicel M101, lactose monohydrat, Calci dibasicphosphat, Natri starch glycolat, Kolidon, HPMC 606, HPMC 615, Magnesi stearat, Aerosil, Dioxit titan, PEG 6000, Ponceau 4R).

4. Mô tả sản phẩm

Viên nén dùng đường uống.

Viên nén bao phim màu trắng, hình tròn, cạnh và thành viên lảnh lặn.

5. Quy cách đóng gói: Ví 10 viên, hộp 5 ví.

6. Thuốc dùng cho bệnh gì:

OMNIVASTIN chứa quetiapin thuộc nhóm thuốc chống loạn thần. OMNIVASTIN có thể được sử dụng để điều trị vài bệnh như:

- **Trầm cảm lưỡng cực:** bệnh nhân cảm thấy buồn. Bệnh nhân có thể thấy rằng họ cảm thấy trầm cảm, cảm thấy có lỗi, thiếu năng lượng, mất cảm giác ngon miệng hoặc không thể ngủ.
- **Hưng cảm:** bệnh nhân cảm thấy rất phấn khích, hoan hỉ, kích động, hăng hái hoặc hiếu động thái quá đến nỗi bao gồm tấn công hoặc đập phá.
- **Tâm thần phân liệt:** bệnh nhân có thể nghe thấy tiếng động hay giọng nói không có thật, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ, lo âu, căng thẳng hoặc trầm cảm.

Bác sĩ có thể tiếp tục kê đơn thuốc này thậm chí khi bệnh nhân cảm thấy khá hơn.

7. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:

Luôn luôn dùng thuốc chính xác như bác sĩ hay dược sĩ đã hướng dẫn để đạt kết quả tốt nhất và giảm nguy cơ của các tác dụng phụ. Hỏi lại bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không chắc chắn.

Bác sĩ sẽ quyết định liều ban đầu cho bệnh nhân. Liều duy trì (liều hàng ngày) sẽ tùy thuộc và bệnh trạng và nhu cầu nhưng thường giữa 150mg và 800mg.

- Bệnh nhân sẽ dùng thuốc một lần/ngày, lúc đi ngủ hoặc 2 lần/ngày, tùy thuộc vào bệnh trạng.

- Nuốt nguyên viên thuốc với nước.

- Bệnh nhân có thể dùng thuốc có hoặc không có thức ăn.

- Không uống nước bưởi trong khi dùng OMNIVASTIN. Nó có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

- Không ngưng dùng thuốc thậm chí nếu bệnh nhân cảm thấy khá hơn, trừ phi được bác sĩ thông báo.

Các vấn đề về gan

OMNIVASTIN chứa lactose

OMNIVASTIN chứa lactose monohydrat, một loại đường. Nếu bệnh nhân được bác sĩ thông báo không dung nạp một số đường, liên lạc với bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

16. Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ:

Nếu bệnh nhân ngừng dùng OMNIVASTIN

Nếu bệnh nhân đột ngột ngừng dùng quetiapin, bệnh nhân không thể ngủ (mất ngủ), hoặc có thể buồn nôn, hoặc bị đau đầu, tiêu chảy, nôn, chóng mặt hoặc kích ứng. Bác sĩ có thể đề nghị bệnh nhân giảm liều từ từ trước khi ngừng điều trị

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc dùng thuốc này, hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.

17. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tên, địa chỉ, biểu tượng (nếu có) của cơ sở sản xuất:



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M (S.P.M CORPORATION)

www.spm.com.vn

Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM

ĐT: (08) 37507496 Fax: (08) 38771010

19. Ngày xem xét, sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: 17/01/2017

Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám Đốc



DS. Nguyễn Thế Kỳ