

Thành phần:

Gel Nhôm phosphat 20%	11 g
Tá dược vđ	20 g
(Tá dược: Đường Aspartam, Nipazin, Natri benzoat, Pectin, Gum xanthan, Sorbitol, Parafin, Hương cam, Nước cất, NaOH)	

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống.

Qui cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 g.

Hộp 20 gói x 20 g.

Chỉ định:

- Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mãn tính, loét dạ dày, tá tràng, kích ứng dạ dày, các hội chứng thừa acid như rát bỏng, ợ chua và hiện tượng tiết nhiều acid, thí dụ trong thời kỳ thai nghén.
- Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khi dùng quá nhiều nicotin, cafe, kẹo, hoặc thức ăn quá nhiều gia vị.
- Biến chứng của thoát vị cơ hoành, viêm đại tràng.

Chống chỉ định:

Các trường hợp mẫn cảm với nhôm hoặc các chế phẩm chứa nhôm.

Thận trọng:

- Tránh điều trị liều cao và lâu dài ở người suy thận.
- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
 - + Phụ nữ có thai: Các thuốc kháng acid thường được coi là an toàn, miễn là tránh dùng lâu dài và liều cao.
 - + Mặc dù một lượng nhỏ nhôm được thải trừ qua sữa, nhưng nồng độ không đủ gây tác hại đến trẻ bú mẹ.
- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy:
Thuốc không gây ảnh hưởng gì khi lái xe và vận hành máy.

Tương tác thuốc:

- Tất cả các thuốc kháng acid đều có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu của các thuốc

dùng đồng thời, do làm thay đổi thời gian dịch chuyển qua đường dạ dày ruột, hoặc do liên kết hoặc tạo phức với thuốc. Ví dụ: Tetracyclin tạo phức với các thuốc kháng acid, do vậy dùng Tetracyclin phải cách xa 1 - 2 giờ trước hoặc sau khi dùng các thuốc kháng acid.

- Các kháng acid làm giảm hấp thu các thuốc: digoxin, indomethacin, muối sắt, isoniazid, clodiazepoxid, naproxen.
- Các kháng acid làm tăng hấp thu dicumarol, pseudo-ephedrin, diazepam.
- Các thuốc kháng acid làm tăng pH nước tiểu, làm thải trừ các thuốc bazơ yếu, tăng thải trừ các thuốc là acid yếu.

Tác dụng phụ:

Có thể gây táo bón, nhất là ở người bệnh liệt giường và người lớn tuổi. Nên bổ sung nước cho bệnh nhân trong trường hợp này.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

Cách dùng - Liều dùng:

Uống 1- 2 thìa canh hỗn dịch hoặc 1- 2 gói hỗn dịch, uống giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu.

Quá liều và cách xử trí:

Hiện chưa tìm thấy trong các tài liệu.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y
TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung,
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Tel: 056. 3846040 * Fax: 056. 3846846