



3. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 10ml dự kiến



4. Nhãn hộp POVIDON IOD 10ml dự kiến



5. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 20ml

Tiêu Chuẩn: USP 35 SĐK:

Povidon iod 10% Lọ 20 ml

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 20 ml
Povidon iod 2 g
Tá dược vừa đủ 20 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khí bóng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zana.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Liều dùng - Cách dùng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

8 935069 609050

6. Nhãn hộp POVIDON IOD 20ml

Povidon iod 10%

Hộp 1 lọ 20 ml

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 20 ml.
Povidon iod 2 g
Tá dược vừa đủ 20 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khí bóng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zana.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0.9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM
TRƯỚC KHI DÙNG.
NẾU CẦN THIÊN THÔNG TIN,
XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Tiêu Chuẩn: USP 35
SĐK:

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

8 935069 609050

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

7. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 50ml

Tiêu Chuẩn: USP 35 SDK:

Povidon iod 10% Lọ 50 ml

Thành phần: Tính cho lọ 50 ml
Povidon iod 5g
Tá dược vừa đủ 50 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc. Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khí bóng, vết rách nứt, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zena.
- Tệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Liều dùng - Cách dùng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

8935069609050

8. Nhãn hộp POVIDON IOD 50ml

Povidon iod 10%

Hộp 1 lọ 50 ml
DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 50 ml.
Povidon iod 5g
Tá dược vừa đủ 50 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khí bóng, vết rách nứt, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zena.
- Tệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Hộp 1 lọ 50 ml
DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ"

Tiêu Chuẩn: USP 35
SDK:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

8935069609050

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

9. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 100ml

Tiêu Chuẩn: USP 35 SDK:

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI Lọ 100 ml

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 100 ml
Povidon iod 10 g
Tá dược vừa đủ 100 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc. Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khí bóng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tưa miệng, chốc lở, herpes simplex, zona.
- Tẩy khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Liều dùng - Cách dùng
Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

89350691609050

10. Nhãn hộp POVIDON IOD 100ml

Hộp 1 lọ 100 ml

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 100 ml.
Povidon iod 10 g
Tá dược vừa đủ 100 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khí bóng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tưa miệng, chốc lở, herpes simplex, zona.
- Tẩy khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Hộp 1 lọ 100 ml

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG,
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN,
XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

Tiêu Chuẩn: USP 35
SDK:

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

89350691609050

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

Tiêu Chuẩn: USP 35

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Lọ 125 ml

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 125 ml
 Povidon iod 12,5 g
 Tá dược 125 ml
 (Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

SBK:

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc. Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bông, vết rách nát, vết mài mòn.

Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virut, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zena.

- Tiết khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc tưới khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Liều dùng - Cách dùng - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
 Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Số lo SX:
Ngày SX:
HD:



9 89 3 06 9 16 0 9 5 0

12. Nhãn hộp POVIDON IOD 125ml

12. Nhãn hộp POVIDON IOD 125ml

Handwritten signature

Povidon iod

Hộp 1 lọ 125 ml

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Thành phần: Tính cho lọ 125 ml.

Povidon iod.....12,5 g

Tá dược.....vừa đủ.....125 ml

(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bong, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zona.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Hộp 1 lọ 125 ml

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG,
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN,
XIN HỎI Y KIẾN CỦA BÁC SĨ

Tiêu Chuẩn: USP 35

SDK:

Số SX:
Ngày SX:
HĐ

13. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 200ml dự kiến

Lọ 200 ml

Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Thành phần: Tính cho lọ 200 ml.
Povidon iod.....20 g
Tá dược.....vừa đủ.....200 ml
(Dinatri hydrophotphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bông, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zena.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0.9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN KIẾN CỦA BÁC SĨ *



Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 Tiêu Chuẩn: USP 35 SDK:

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUANG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

14. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 500ml dự kiến

Lọ 500 ml

Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Thành phần: Tính cho lọ 500 ml.
Povidon iod.....50 g
Tá dược.....vừa đủ.....500 ml
(Dinatri hydrophotphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bông, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như tinea, tua miệng, chốc lở, herpes simplex, zena.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0.9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN KIẾN CỦA BÁC SĨ *



Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 Tiêu Chuẩn: USP 35 SDK:

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUANG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

15. Nhãn trên lọ POVIDON IOD 1000ml dự kiến

THUỐC CUNG CẤP CHO BỆNH VIỆN

Lọ 1000 ml

Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Thành phần: Tính cho lọ 1000 ml.
Povidon iod.....100 g
Tá dược.....vừa đủ1000 ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bông, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như *tinea*, tua miệng, chốc lở, *herpes simplex*, zena.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN KIẾN CỬA BÁC SĨ"


8 935069 609050

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

 **Tiêu Chuẩn: USP 35 SDK:**

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Mỹ - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình



16. Nhãn trên lọ xịt POVIDON IOD 50ml đủ kiến

Mã số: 3100137028 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
QUẢNG BÌNH
TP. ĐỒNG HỚI - T. QUẢNG BÌNH

Lọ xịt 50 ml

Thành phần: Tính cho lọ 50ml.
Povidon iod.....5g
Tá dược.....vừa đủ 50ml
(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)
Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:
- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như *tinea*, tua miệng, chốc lở, *herpes simplex*, *zeta*.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.
Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.
Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ"

Tiêu Chuẩn: USP 35
SĐK:
Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý -
TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

17. Nhãn trên Hộp 1 lọ xịt POVIDON IOD 50ml dự kiến



18. Nhãn trên lọ xịt POVIDON IOD 100ml dự kiến



Lọ xịt 100 ml

Thành phần: Tính cho lọ 100 ml.
Povidon iod.....10 g
Tá dược.....vừa đủ100 ml
(Dinatri hydrophotphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bông, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như *tinea*, tua miệng, chốc lở, *herpes simplex*, *zeta*.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Povidon iod 10%

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ"

Tiêu Chuẩn: USP 35
SĐK:

Số lô SX:
Ngày SX:
HĐ:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý -
TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

19. Nhãn trên Hộp 1 lọ xịt POVIDON IOD 100ml dự kiến



20. Nhãn trên lọ xịt POVIDON IOD 500ml dự kiến

M.S.D.N: 3100137028 - C.T.C.P

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
QUẢNG BÌNH
TP. ĐÔNG HỚI - T. QUẢNG BÌNH

Lọ xịt 500 ml

Povidon iod 10%

DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Thành phần: Tính cho lọ 500 ml.

Povidon iod.....50 g

Tá dược.....vừa đủ.....500 ml

(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định: Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bỏng, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như *tinea*, tua miệng, chốc lở, *herpes simplex*, *zeta*.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Chống chỉ định - Tác dụng không mong muốn và các thông tin khác:

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để tưới rửa vết thương.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG"

NEU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN KIẾN CỦA BÁC SĨ"



8 935069 609050

Số lô SX:
Ngày SX:
HD:

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG



Tiêu Chuẩn: USP 35 SDK:

CÔNG TY CP. DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH
46 Đường Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP. Đông Hội - Tỉnh Quảng Bình

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:

Dung dịch dùng ngoài

POVIDON IOD 10%

Thành phần: Tính cho 8ml thành phẩm

Povidon iod0,8 g

Tá dược.....vừa đủ.....8 ml

(Dinatri hydrophosphat, acid citric monohydrat, glycerin, nonoxinol 9, nước tinh khiết)

Chỉ định : Dung dịch Povidon iod 10% dùng để:

- Diệt mầm bệnh ở da, vết thương và niêm mạc.
- Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết thương sau khi phẫu thuật.
- Dự phòng nhiễm khuẩn khi bong, vết rách nát, vết mài mòn. Điều trị những trường hợp khác nhau về nhiễm khuẩn, virus, đơn bào, nấm ở da, như *tinea*, tưa miệng, chốc lở, *herpes simplex*, *zona*.
- Tiệt khuẩn tay để làm vệ sinh hoặc trước khi mổ.
- Để sát khuẩn và giúp vệ sinh cá nhân tốt hơn.

Liều dùng - Cách dùng: Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/5 với nước hay dung dịch sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) để rửa vết thương.

Chống chỉ định:

- Tiền sử quá mẫn với iod.
- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp (đặc biệt bướu giáp nhân colloid, bướu giáp lưu hành và viêm tuyến giáp Hashimoto), thời kỳ mang thai và thời kỳ cho con bú.
- Thủng màng nhĩ hoặc bôi trực tiếp lên màng não.
- Khoang bị tổn thương nặng.
- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ sơ sinh.

Thận trọng: Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền sử suy thận, người bệnh đang điều trị bằng lithi.

Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:

Tránh dùng thường xuyên cho các đối tượng này vì iod qua được hàng rào nhau thai và bài tiết qua sữa. Mặc dầu chưa có bằng chứng về nguy hại nhưng vẫn nên thận trọng và cần cân nhắc giữa lợi ích điều trị và tác dụng có thể gây ra do hấp thụ iod đối với sự phát triển và chức năng tuyến giáp thai nhi.

Đối với người đang lái xe và vận hành máy móc: Dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác với các thuốc khác:

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein. Xà phòng không làm mất tác dụng.
- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: gây ăn da.



- Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao và các thuốc sát khuẩn khác.
- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp

Tác dụng không mong muốn:

Chế phẩm có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc dầu thuốc ít kích ứng hơn iod tự do. Dùng với vết thương rộng và vết bỏng nặng, có thể gây phản ứng toàn thân.

Thường gặp, ADR > 1/100

Iod được hấp thu mạnh ở vết thương rộng và vết bỏng nặng có thể gây nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương chức năng thận.

Đối với tuyến giáp: Có thể gây giảm năng tuyến giáp và nếu có giảm năng tuyến giáp tiềm tàng, có thể gây cơn nhiễm độc giáp.

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính ở những người bệnh bị bỏng nặng.

Thần kinh: Co giật ở những người bệnh điều trị kéo dài.

ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100

Huyết học: Giảm bạch cầu trung tính ở những người bệnh bị bỏng nặng.

Thần kinh: Co động kinh(nếu điều trị Povidon iod kéo dài).

Dị ứng, như viêm da do iod, đốm xuất huyết, viêm tuyến nước bọt nhưng với tỉ lệ rất thấp.

Đã thấy iod trong nước ối của người mẹ dùng povidon iod gây suy giáp và bướu giáp bẩm sinh do thuốc ở trẻ sơ sinh, mặc dầu người mẹ dùng lượng thấp iod làm thuốc sát khuẩn. Tuy nhiên: povidon iod cũng có thể gây cường giáp.

"Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc"

Quá liều và xử lý: Lượng iod quá thừa sẽ gây bướu giáp, nhược giáp hoặc cường giáp. Dùng chế phẩm nhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ gây nhiều tác dụng không mong muốn như: vị kim loại, tăng tiết nước bọt, đau rát họng và miệng; mắt bị kích ứng, sưng; đau dạ dày, ỉa chảy, khó thở do phù phổi...Có thể có nhiễm acid chuyển hóa, tăng natri huyết và tổn thương thận.

Trong trường hợp uống nhầm một lượng lớn povidon iod, phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cân bằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

Dược lực học: Povidon iod là phức hợp của iod với poly vinylpyrrolidon, chứa 9 - 12% iod, dễ tan trong nước và trong cồn; dung dịch chứa 0,85 – 1,2 % iod có pH 3,0 – 5,5. Povidon được dùng làm chất mang iod. Dung dịch povidon iod giải phóng iod từ từ do đó kéo dài tác dụng sát khuẩn diệt khuẩn, nấm, virus, động vật đơn bào, kén và bào tử. Vì vậy; tác dụng của thuốc kém hơn các chế phẩm chứa iod tự do nhưng ít độc hơn vì lượng iod tự do thấp hơn, dưới 1 phần triệu trong dung dịch 10%.

Dược động học: Dung dịch Povidon iod phóng thích dần dần và liên tục iod. Iod thẩm được qua da và thải qua nước tiểu. Cùng lúc chất povidon được phóng thích sẽ tạo lớp màng che chở vết thương. Hấp thu toàn thân phụ thuộc vào vùng và tình trạng sử dụng thuốc (diện rộng, da, niêm mạc, vết thương, các khoang trong cơ thể). Khi dùng làm dung dịch rửa các khoang trong cơ thể,



toàn bộ phức hợp cao phân tử povidon iod cũng có thể được cơ thể hấp thu. Phức hợp này không chuyển hóa hoặc đào thải qua thận. Thuốc được hệ thống liên võng nội mô lọc giữ.

Qui cách đóng gói : Hộp 01 lọ 8ml, hộp 01 lọ 10ml, hộp 01 lọ 20ml, hộp 01 lọ 50ml, hộp 01 lọ 100ml, hộp 01 lọ 125ml, lọ 200ml, lọ 500ml, lọ 1000ml. Hộp 01 lọ xịt 50ml, hộp 01 lọ xịt 100ml, lọ xịt 500ml

Bảo quản: Để nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: USP 35

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM

**“ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ”**


CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH

46 Đường Hữu Nghị -Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

ĐT: 052.3822475 - Fax: 052.3820720

Ngày 25 tháng 10 năm 2014

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH



**TUO CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG**
Nguyễn Thị Thu Thủy

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ds. Nguyễn Thị Mai