

( Viên nang mềm )

# Shine TADENO

Shine TADENO

( Viên nang mềm )

**THÀNH PHẦN:**

Pygeum Africanum Extract..... 50 mg  
(Dầu đậu nành, Lecithin, Sáp ong, Palm oil, Gelatin, Glycerin, Nước RO, Nipagin, Nipazol, Màu green dye, Titan dioxyd, Ethanol 96%)

**ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰC HỌC:**

Trên thực nghiệm, người ta đã xác minh được tác dụng của dịch chiết Pygeum Africanum trên sự chống tăng sinh ở nguyên bào sợi được kích thích bởi b-FGF (yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi tính kiềm), mà bệnh học hiện nay đã nói đến. Mặt khác, điều rất đáng chú ý là dịch chiết Pygeum Africanum không ảnh hưởng đến kích thích tố của hệ sinh dục nam.

**CHỈ ĐỊNH:**

Phòng và hỗ trợ điều trị rối loạn đường tiểu do phì đại lành tính tiền liệt tuyến, di chứng phẫu thuật cắt bỏ tiền liệt tuyến và ung thư tiền liệt tuyến.

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**

Uống ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên vào buổi sáng và buổi chiều, uống trước bữa ăn.  
Thông thường điều trị trong 6 tuần, có thể kéo dài đến 8 tuần.  
Có thể lặp lại điều trị nếu cần thiết.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Chống chỉ định với các bệnh nhân nhạy cảm với Pygeum Afrfricanum hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

**LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:**

Tác động của Shine TADENO trên các rối loạn chức năng, không loại trừ các kiểm tra y tế thông thường, Shine TADENO không thay thế được phẫu thuật.

**TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:**  
Chưa có nghiên cứu tương tác các loại thuốc khác.

**SỬ DỤNG TRÊN PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:**  
Thuốc này chỉ có tác dụng trên tuyến tiền liệt của nam, chống chỉ định cho phụ nữ.

**ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC**  
Thuốc không gây ngủ nên sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Hiếm khi thấy rối loạn đường tiêu hóa: nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy.  
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn khi gặp phải

**QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:**

Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được theo dõi và điều trị hỗ trợ thích hợp nhất định.

**ĐÓNG GÓI:** Hộp 3 vỉ x 10 viên.

**BẢO QUẢN:** Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  
**TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:** Tiêu chuẩn nhà sản xuất.  
**HẠN DÙNG:** 36 tháng, không dùng thuốc đã hết hạn sử dụng ghi trên nhãn.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc.  
Chỉ dùng thuốc này theo sự kê đơn của thầy thuốc.

**Sản xuất tại:**

**Công ty CP Dược phẩm MEDISUN**

Địa chỉ: 521 An Lợi, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0650. 3589 036 - Fax: 0650. 3589297

**Phân phối bởi:**

**Công ty TNHH SHINE PHARMA (Shine Pharma CO.,Ltd)**

Địa chỉ: 3/38/40 ThànhThái, P.14, Q.10, TPHCM, Việt Nam

Điện thoại: 028.38688168 - Fax: 028.38688169