

Oresol 245

Bù nước - chất điện giải bằng đường uống HIỆU QUẢ

- Nồng độ thẩm thấu thấp 245 mmol/l
- Giảm > 30 % tì lệ truyền dịch
- Giảm 25 % lượng phân thải
- Giảm 30 % tì lệ nôn ói

CÔNG THỨC	
Mỗi gói Oresol 245 pha trong 200 ml nước chứa:	
Natri clorid	520 mg
Natri citrat dihydrat	580 mg
Kali clorid	300 mg
Glucose khán	2,7 g
Tá dược vừa đủ	1 gói

Nồng độ điện giải tương đương		Khuyến cáo mới nhất của WHO/UNICEF
Natri	75 mmol/l	75 mmol/l
Kali	20 mmol/l	20 mmol/l
Clorid	65 mmol/l	65 mmol/l
Citrat	10 mmol/l	10 mmol/l
Glucose	75 mmol/l	75 mmol/l
Nồng độ thẩm thấu	245 mmol/l	245 mmol/l

DẠNG BAO CHẾ: Thuốc bột.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 20 gói x 4,1 g thuốc bột.

TÍNH CHẤT: Oresol 245 là dung dịch bù nước và chất điện giải có nồng độ thẩm thấu thấp theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức y tế thế giới (WHO) được dùng trong điều trị các trường hợp mất nước.

CHỈ ĐỊNH: Dùng trong điều trị mất nước do tiêu chảy ở trẻ em và người lớn. Dùng để thay thế nước và chất điện giải bị mất trong các trường hợp: tiêu chảy cấp, nôn mửa, sốt cao, sốt xuất huyết độ I, II, III (nếu trẻ uống được) hay khi hoạt động thể lực (chơi thể thao, luyện tập năng nhọc, vận động viên, những người làm việc lâu trong môi trường nắng nóng...).

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Người bị rối loạn dung nạp glucose, suy thận cấp, tắc ruột, liệt ruột, thủng ruột. Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Cần tuân theo đúng cách pha và lượng dung dịch cho uống như đã đề nghị để tránh thấp liều hay quá liều. Trong trường hợp mất nước nghiêm trọng, chỉ được áp dụng liệu pháp bù nước bằng đường uống khi liệu pháp tiêm truyền không có sẵn để thực hiện.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Thuốc dùng được cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai hoặc đang cho con bú.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MỘC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Oresol 245 không tương tác với thức ăn hoặc thuốc khác.

TẮC DUNG KHÔNG MONG MUỐN: Không có tác dụng không mong muốn nếu pha đúng cách, dung thể tích nước và dung dung liều lượng.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỆU VÀ CÁCH XỬ TRỊ: Triệu chứng quá liều bao gồm tăng natri huyết: hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, tăng huyết áp, cău gắt, sốt cao,... và triệu chứng thừa nước: mệt hộp họng, phù toàn thân, suy tim. Điều trị tăng natri huyết: truyền tĩnh mạch chàm dung dịch: nhucre trương và cho uống nước. Điều trị thừa nước: ngừng cho uống dung dịch Oresol 245 và dùng thuốc lợi tiểu nếu cần.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Pha 1 gói Oresol 245 vào 200 ml nước đun sôi để nguội, ngay trước khi dùng.

Sau khi pha xong, có thể giữ để uống trong 24 giờ. Luôn tắt kỹ hoặc khóa kỹ trước khi sử dụng.

Phòng ngừa mất nước do tiêu chảy: tiều trung bình 10 ml/kg thể trọng sau mỗi lần đi tiêu phân lỏng.

Vẫn tiếp tục cho trẻ bú hoặc ăn bình thường nếu dung nạp tốt.

Bù mất nước từ nhẹ đến vừa trong trường hợp tiêu chảy: tiều trung bình 75 ml/kg thể trọng trong 4 giờ đầu. Sau 4 giờ, đánh giá lại bệnh nhân.

Nếu không còn dấu hiệu mất nước chuyển sang liều phòng ngừa. Nếu vẫn còn dấu hiệu mất nước lặp lại liều trên.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu mất nước nặng, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngay để khẩn cấp bù nước qua đường tĩnh mạch.

Phòng ngừa mất nước trong các trường hợp khác (không do tiêu chảy): uống dung dịch Oresol 245 từng ngụm theo khả năng.

Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Tiêu chuẩn: TCCS

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Chi nhánh nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang
Lô B2 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thành - giải đoạn 1, xã Tân Phú Thành, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
ĐT: (0293) 3953454 • Fax: (0293) 3953555

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Tân Phú Thành, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
ĐT: 0292.38939000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

01